



ចំណេះដឹងគ្រប់វិទ្យា

កំរងវិទ្យាសាស្ត្រគណិតវិទ្យា

$$\frac{4-x}{1986} + \frac{3-x}{1987} + \frac{2-x}{1988} + \frac{1-x}{1989} = -$$

$$\frac{1}{1+a+a^2} + \frac{1}{1+b+bc} + \frac{1}{1+c+ca} =$$

រូបមន្ត:

វិទ្យាសាស្ត្រប្រឡងជ្រើសរើសគ្រូបឋមសិក្សា
 វិទ្យាសាស្ត្រប្រឡងជ្រើសរើសគ្រូបឋមសិក្សា
 វិទ្យាសាស្ត្រត្រូវប្រឡងផ្សេងៗ.....

ស្របតាមកម្មវិធីសិក្សាថ្មី

វិញ្ញាសាទី១

ប្រឡងជ្រើសរើសគ្រូមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិ

សម័យប្រឡង: ១១ តុលា ២០០២

រយៈពេល: ២ ម៉ោង



1. ក. ដោះស្រាយសមីការក្នុងសំណុំចំនួនកុំផ្លិច $x^2 - 2x + 5 = 0$

ខ. គណនាឫសការេនៃចំនួនកុំផ្លិច $8-6i$ ។

2. ក. គណនាអាំងតេក្រាលមិនកំណត់

$$I = \int \cos^2 x dx$$

$$J = \int x \sin x dx$$

ខ. រកព្រីមីទីវនៃអនុគមន៍ $f(x) = 2x(x^3 + 1)$ ដោយដឹងថាព្រី

មីទីវនៃអនុគមន៍នេះស្មើនឹង 3 កាលណា $x = -1$ ។

3. គេអោយអនុគមន៍ $f(x) = \frac{x-1}{|x|+1}$

ក. សិក្សាភាពជាប់នៃអនុគមន៍ f ត្រង់ចំណុច $x=0$

ខ. តើអនុគមន៍ f មានដេរីវេត្រង់ចំណុច $x=0$ ដែរឬទេ ?

4. ដោះស្រាយសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល (E): $y'' + 4y' + 4y = 0$

ខ. គេអោយសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល $(F): y'' + 4y' + 4y = -4x$ ។

កំណត់ចំនួនពិត a និង b ដែលអនុគមន៍ $\varphi: x \mapsto ax + b$

ជាចំណើយនៃ (F) ។

5. ក្នុងតំលៃអរតូណរម៉ាល់ $(0; \vec{i}; \vec{j}; \vec{k})$ គេមានចំណុច $A(2; 2; 2)$

$B(2; 0; 1)$ និង $C(4; 1; -1)$

ក. បង្ហាញថាត្រីកោណ ABC ជាត្រីកោណកែងត្រង់ B

ខ. រកសមីការប្លង់ដែលកាត់តាមបីចំណុចនេះ ។

6. គេអោយអនុគមន៍ $y = \frac{1}{(x-1)^2} + \frac{1}{(x+1)^2}$

ក. សិក្សាទិសដៅអថេរភាព និង សង់ខ្សែកោង (c) តាងក្រាបនៃ
អនុគមន៍

ខ. គណនាផ្ទៃក្រឡានៃប្លង់ខណ្ឌដោយខ្សែកោង (c) បន្ទាត់ $x = 2$
និង $x = 5$

ចំណើយ

1. ក. ដោះស្រាយសមីការក្នុងសំណុំចំនួនកុំផ្លិច

$$x^2 - 2x + 5 = 0$$

$$\Delta' = 1 - 5 = -4 = (2i)^2$$

$$\Rightarrow x_1 = \frac{-b' - \sqrt{\Delta'}}{a} = 1 - 2i$$

$$x_2 = \frac{-b' + \sqrt{\Delta'}}{a} = 1 + 2i$$

ដូចនេះ

$$x_1 = 1 - 2i; x_2 = 1 + 2i$$

ខ. គណនាបូសការេនៃចំនួនកុំផ្លិច $8 - 6i$

$$\text{តាង } Z = 8 - 6i$$

$$= 9 - 6i - 1$$

$$= 3^2 - 2 \cdot 3i + i^2$$

$$= (3 - i)^2$$

$$\text{គេបាន } \sqrt{Z} = \sqrt{(3 - i)^2}$$

$$\Rightarrow Z_1 = 3 - i; Z_2 = -(3 - i) = -3 + i$$

ដូចនេះ

$$Z_1 = 3 - i; Z_2 = -3 + i$$

2. ក. គណនាអាំងតេក្រាលមិនកំណត់

$$\begin{aligned} I &= \int \cos^2 x dx = \int \frac{1 + \cos 2x}{2} dx \\ &= \frac{1}{2} \int (1 + \cos 2x) dx = \frac{1}{2} \left(x + \frac{1}{2} \sin 2x \right) + c \end{aligned}$$

ដូចនេះ

$$I = \frac{1}{2} \left(x + \frac{1}{2} \sin 2x \right) dx + c$$

$$J = \int x \sin x dx$$

$$\text{តាង } u = x \Rightarrow du = dx$$

$$dv = \sin x dx \Rightarrow v = -\cos x$$

$$\text{តាមរូបមន្ត } \int u dv = uv - \int v du$$

$$\text{គេបាន: } J = -x \cos x - \int -(\cos x) dx$$

$$= -x \cos x + \sin x + c$$

ដូចនេះ

$$J = -x \cos x + \sin x + c$$

ខ. រកព្រីមីទីវនៃ f

$$f(x) = 2x(x^3 + 1)$$

ព្រីមីទីវនៃ f គឺ F កំណត់ដោយ $F(x) = \int f(x) dx$

$$F(x) = \int 2x(x^3 + 1) dx$$

$$= \int (2x^4 + 2x) dx$$

$$= \frac{2}{5}x^5 + x^2 + c$$

$$F(x) = \frac{2}{5}x^5 + x^2 + c$$

$$\text{ដោយ } F(-1) = 3 \Leftrightarrow \frac{2}{5}(-1)^5 + (-1)^2 + c = 3$$

$$-\frac{2}{5} + 1 + c = 3$$

$$c = 3 + \frac{2}{5} - 1$$

$$c = \frac{15 + 2 - 5}{5}$$

$$c = \frac{12}{5}$$

ដូចនេះ

$$F(x) = \frac{2}{5}x^5 + x^2 + \frac{12}{5}$$

3. គេអោយអនុគមន៍ $f(x) = \frac{x-1}{|x|+1}$

ក. សិក្សាភាពជាប់នៃ f ត្រង់ $x = 0$

គេមាន: $f(0) = -1$

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 0^-} \left(\frac{x-1}{|x|+1} \right) \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^-} \left(\frac{x-1}{-x+1} \right) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{-(-x+1)}{(-x+1)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^-} (-1) = -1\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x-1}{|x|+1} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{x-1}{x+1} \right) = -1\end{aligned}$$

ដោយ $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = f(0) = -1$

ដូចនេះ អនុគមន៍ f ជាប់ត្រង់ចំណុច $x = 0$ ។

ខ. តើ f មានដេរីវេត្រង់ $x = 0$ ដែរឬទេ ?

តាមរូបមន្តដេរីវេ $f'(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h + x_0) - f(x_0)}{h}$

គេបាន: $f'_-(0) = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(h) - f(0)}{h}$

$$= \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{\frac{h-1}{|h|+1} + 1}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{h-1+|h|+1}{h(|h|+1)}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{h-1-h+1}{h(-h+1)} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \left(\frac{0}{-h^2+h} \right) = 0$$

$f'_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(h) - f(0)}{h}$

$$= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{h-1+|h|+1}{h(|h|+1)} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{h-1+h+1}{h(h+1)}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{2h}{h(h+1)} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{2}{(h+1)} = 2$$

ដោយ $f'_-(0) = 0 \neq f'_+(0) = 2$

ដូចនេះ អនុគមន៍ f មិនមានដេរីវេត្រង់ $x = 0$ ទេ ។

4. ក. ដោះស្រាយសមីការ (E) : $y'' + 4y' + 4y = 0$

មានសមីការសំគាល់ : $r^2 + 4r + 4 = 0$

$$\Delta' = b'^2 - ac = 2^2 - 4 = 0$$

$$\Rightarrow r_0 = \frac{-b'}{a} = -2$$

គេបាន : $y = (Ax + B)e^{-2x}$, (A, B ជាចំនួនពិត)

ដូចនេះ

$y = (Ax + B)e^{-2x}$; ($A, B \in \mathbb{R}$) ជាអនុគមន៍
ចំណេញទូទៅនៃ (E)

ខ. កំណត់តម្លៃ a និង b

គេមាន $F(x) : y'' + 4y' + 4y = -4x$

ហើយ $\varphi(x) = ax + b$ ជាចំណេញនៃ (F)

$$\Rightarrow \varphi'(x) = a$$

$$\Rightarrow \varphi''(x) = 0$$

គេបាន: $\varphi''(x) + 4\varphi'(x) + 4\varphi(x) = -4x$

$$0 + 4a + 4(ax + b) = -4x$$

$$0 + 4a + 4ax + 4b = -4x$$

$$4ax + 4a + 4b = -4x$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 4a = -4 \\ 4a + 4b = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -1 \\ b = 1 \end{cases}$$

ដូចនេះ: $a = -1; b = 1$

5. គេអោយចំណុច $A(2;2;2)$, $B(2;0;1)$ និង $C(4;1;-1)$

គេបាន: $\vec{BA}(0;2;1)$, $\vec{BC}(2;1;-2)$

ក. បង្ហាញថាត្រីកោណ ABC ជាត្រីកោណកែងត្រង់ B

$$\vec{BA} \cdot \vec{BC} = 0 \cdot 2 + 2 \cdot 1 + 1(-2)$$

$$= 2 - 2 = 0$$

ដោយ $\vec{BA} \cdot \vec{BC} = 0$

$$\Rightarrow BA \perp BC \text{ ត្រង់ } B$$

ដូចនេះ: ត្រីកោណ ABC ជាត្រីកោណកែងត្រង់ B

ខ. រកសមីការប្លង់ដែលកាត់តាមបីចំណុចនេះ :

$$\vec{BA} \times \vec{BC} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 0 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & -2 \end{vmatrix} = -5\vec{i} + 2\vec{j} - 4\vec{k}$$

ប្លង់ (ABC) កាត់តាម $A(2;2;2)$ ហើយកែងនឹងវ៉ិចទ័រ

$\vec{BA} \times \vec{BC}(-5;2;-4)$ កំណត់ដោយ:

$$(ABC): -5(x-2) + 2(y-2) - 4(z-2) = 0$$

$$-5x + 2y - 4z + 10 - 4 + 8 = 0$$

$$-5x + 2y - 4z + 14 = 0$$

$$5x - 2y + 4z - 14 = 0$$

ដូចនេះ: $(ABC): 5x - 2y + 4z - 14 = 0$

6. គេអោយ $y = \frac{1}{(x-1)^2} + \frac{1}{(x+1)^2}$

ក. សិក្សាទិសដៅអថេរភាព និង សង់ខ្សែកោង (c)

ដែនកំណត់ $D_f = R - \{-1;1\}$

ទិសដៅអថេរភាព

$$\begin{aligned}
 f'(x) &= \frac{-2}{(x-1)^3} + \frac{-2}{(x+1)^3} \\
 &= \frac{-2(x+1)^3 - 2(x-1)^3}{(x^2-1)^3} \\
 &= \frac{-2(x^3 + 3x^2 + 3x + 1) - 2(x^3 - 3x^2 + 3x - 1)}{(x^2-1)^3} \\
 &= \frac{-4x^3 - 12x}{(x^2-1)^3} = \frac{-4x(x^2+3)}{(x^2-1)^3} = \frac{-4x(x^2+3)}{(x^2-1)^2(x^2-1)}
 \end{aligned}$$

$\text{iii } f'(x) = 0 \Leftrightarrow \frac{-4x(x^2+3)}{(x^2-1)^3} = 0$

 $\text{or } \frac{x^2+3}{(x^2-1)^2} > 0$

$-4x = 0$
 $\Rightarrow x = 0$

$\forall x \in \mathbb{R}$

$\Rightarrow f(x_0)$ is a local extremum

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$
$-4x$	+	+	0	-	-
$x^2 - 1$	+	0	-	0	+
$f'(x)$	+	-	+	-	-

តំលៃបរមា: $f(0) = 2$

គណនាលីមីត និង អាស៊ីមតូត

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left[\frac{1}{(x-1)^2} + \frac{1}{(x+1)^2} \right] = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = \lim_{x \rightarrow -1} \left[\frac{1}{(x-1)^2} + \frac{1}{(x+1)^2} \right] = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1} \left[\frac{1}{(x-1)^2} + \frac{1}{(x+1)^2} \right] = +\infty$$

អាស៊ីមតូត

$$\text{ដោយ } \lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = 0$$

$\Rightarrow$ បន្ទាត់ $y = 0$ ជាអាស៊ីមតូតដេកនៃក្រាប (c) ។

$$\text{ដោយ } \lim_{x \rightarrow -1} f(x) = +\infty \quad \text{និង} \quad \lim_{x \rightarrow 1} f(x) = +\infty$$

$\Rightarrow$ បន្ទាត់ $x = -1$ និង $x = 1$ ជាអាស៊ីមតូតឈរនៃក្រាប (c) ។


តារាងអថេរភាពនៃ f

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$
$f'(x)$	$+$	$-$	0	$+$	$-$
$f(x)$	$0 \nearrow +\infty$	$+\infty \searrow 2$	$2 \nearrow +\infty$	$+\infty \searrow 0$	

សង់ក្រាប (c)

តារាងតម្លៃលេខជំនួយ

x	-3	-2	2	3
y	$0,3$	$1,1$	$1,1$	$0,3$



ខ. គណនាក្រឡាផ្ទៃខណ្ឌដោយខ្សែកោង (c) បន្ទាត់ $x = 2$ និង $x = 5$

$$\begin{aligned}
 S &= \int_2^5 f(x) dx = \int_2^5 \left[\frac{1}{(x-1)^2} + \frac{1}{(x+1)^2} \right] dx \\
 &= \left(\frac{-1}{x-1} + \frac{-1}{x+1} \right) \Big|_2^5 = \left(\frac{-1}{4} + \frac{-1}{6} \right) - \left(-1 + \frac{-1}{3} \right) \\
 &= \frac{-3-2}{12} - \frac{-12-4}{12} = \frac{-5}{12} + \frac{16}{12} = \frac{11}{12}
 \end{aligned}$$

ដូចនេះ

$$S = \frac{11}{12} \text{ (ឯកតាផ្ទៃ)}$$

វិញ្ញាសាទី២

ប្រឡងជ្រើសរើសគ្រូមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិ

សម័យប្រឡង: ១៥ តុលា ២០០៣

រយៈពេល: ២ ម៉ោង



- ① ក. សរសេរចំនួនកុំផ្លិចជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ $1 + i\sqrt{3}$
ខ. ដោះស្រាយសមីការ: $|Z| - Z = 1 + 2i$ (Z ជាចំនួនកុំផ្លិច)
2. ក. គណនាដេរីវេនៃអនុគមន៍ $f(x) = x^5 - 2x^4 + 3x^3 - 2$
ខ. កំណត់ដេរីវេទី n នៃអនុគមន៍ $h(x) = x^n$, ($n \in N^*$)
3. រកព្រីមីទីវ $F(x)$ នៃអនុគមន៍ $f(x) = \cos x$ ដែលខ្សែកោងតាង
 $F(x)$ កាត់តាមចំណុច $A(\frac{\pi}{2}; 0)$ ។
- ④ រកចំលើយសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែលផ្ទៀងផ្ទាត់លក្ខខណ្ឌដែលអោយ:
 $y'' - 3y' + 2y = 0$, $y(1) = 1$ និង $y'(1) = 3$
5. គេអោយអនុគមន៍ $f(x) = \frac{ax^2 + bx}{x^2 - 4x + 3}$

ក. រកតម្លៃ a និង b ដោយដឹងថាអនុគមន៍មានតម្លៃអប្បបរមា

ស្មើ 4 ត្រង់ $x = 2$ ។

ខ. សិក្សាទិសដៅអថេរភាព និង សង់ខ្សែកោងនៃអនុគមន៍ $f(x)$

ចំពោះតម្លៃ a និង b ដែលរកឃើញ ។

6. ក្នុងតំរុយអរតូណរម៉ាល់ $(0; \vec{i}; \vec{j}; \vec{k})$ គេអោយប្លង់ពីរ (α)

និង (β) មានសមីការរៀងគ្នា៖

$$3x - 2y + 2z - 5 = 0 \text{ និង } 4x + 5y - z + 1 = 0 \text{ ។}$$

ក. ស្រាយបញ្ជាក់ថាប្លង់ (α) អរតូកូណាល់ប្លង់ (β)

ខ. សរសេរសមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្របន្ទាត់ប្រសព្វនៃប្លង់ (α) និង (β)

7. គេអោយ $\vec{AC} = k \cdot \vec{CB}$ ដែល $k \neq -1$ ហើយ O គឺជាចំណុច

មួយនៃប្លង់ ។ បង្ហាញថា៖
$$\vec{OC} = \frac{\vec{OA} + k \cdot \vec{OB}}{k + 1}$$

ចំណើយ

1. ក. សរសេរចំនួនកុំផ្លិចជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ

$$1 + i\sqrt{3} = 2\left(\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = 2\left(\cos\frac{\pi}{3} + i\sin\frac{\pi}{3}\right)$$

ដូចនេះ

$$1 + i\sqrt{3} = 2\left(\cos\frac{\pi}{3} + i\sin\frac{\pi}{3}\right)$$

ខ. ដោះស្រាយសមីការ $|Z| - Z = 1 + 2i$

$$\text{តាង } Z = a + bi \Rightarrow |Z| = \sqrt{a^2 + b^2}$$

គេបាន:

$$|Z| - Z = 1 + 2i$$

$$\Leftrightarrow \sqrt{a^2 + b^2} - (a + bi) = 1 + 2i$$

$$\sqrt{a^2 + b^2} - a - bi = 1 + 2i$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \sqrt{a^2 + b^2} - a = 1 \\ -b = 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \sqrt{a^2 + b^2} = a + 1 \\ b = -2 \end{cases}$$

$$\text{នាំអោយ } \sqrt{a^2 + (-2)^2} = a + 1$$

$$a^2 + 4 = (a + 1)^2$$

$$a^2 + 4 = a^2 + 2a + 1$$

$$2a = 4 - 1 = 3$$

$$a = \frac{3}{2}$$

ដូចនេះ

$$Z = \frac{3}{2} - 2i \text{ ជាបួសសមីការ}$$

2. ក. រកដេរីវេនៃអនុគមន៍ f

$$f(x) = x^5 - 2x^4 + 3x^3 - 2$$

$$\Rightarrow f'(x) = 5x^4 - 8x^3 + 9x^2$$

ដូចនេះ

$$f'(x) = 5x^4 - 8x^3 + 9x^2$$

ខ. កំណត់ដេរីវេទី n នៃអនុគមន៍ $h(x) = x^n$, ($n \in N^*$)

$$h(x) = x^n$$

$$\Rightarrow h'(x) = nx^{n-1}$$

$$h''(x) = n(n-1)x^{n-2}$$

$$h'''(x) = n(n-1)(n-2)x^{n-3}$$

$$\text{គេបាន: } h^{(n)}(x) = n(n-1)(n-2) \cdot \dots \cdot [n - (n-1)]x^{n-n}$$

$$= n(n-1)(n-2) \cdot \dots \cdot 1 = n!$$

ដូចនេះ: $\boxed{h^{(n)} = n!} \quad (n \in \mathbb{N}^*)$

3. រកព្រីមីទីវ $F(x)$ នៃអនុគមន៍ $f(x) = \cos x$

$$\begin{aligned} F(x) &= \int f(x) dx \\ &= \int \cos x dx \\ &= \sin x + c \end{aligned}$$

ដោយ $F(x)$ កាត់តាមចំណុច $A(\frac{\pi}{2}; 0)$

$$\Rightarrow F(\frac{\pi}{2}) = 0$$

$$\sin \frac{\pi}{2} + c = 0$$

$$1 + c = 0 \Rightarrow c = -1$$

ដូចនេះ: $\boxed{F(x) = \sin x - 1}$ ជាព្រីមីទីវនៃ f

4. រកចំលើយនៃសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែលផ្ទៀងផ្ទាត់លក្ខខណ្ឌ

$$y'' - 3y' + 2y = 0 \text{ មានសមីការសំគាល់ } r^2 - 3r + 2 = 0$$

ចូលរាង $a + b + c = 0$ គឺ $1 - 3 + 2 = 0$

$$\Rightarrow r_1 = 1; r_2 = \frac{c}{a} = 2$$

គេបាន: $y = Ae^x + Be^{2x}, (A, B \in R)$

$$\Rightarrow y' = Ae^x + 2Be^{2x}$$

ដោយគេដឹងថា $\begin{cases} y(1) = 1 \\ y'(1) = 3 \end{cases}$

$$\Rightarrow \begin{cases} Ae + Be^2 = 1 \\ Ae + 2Be^2 = 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} A = -e^{-1} \\ B = 2e^{-2} \end{cases}$$

គេបាន: $y = -e^{-1} \cdot e^x + 2e^{-2} \cdot e^{2x}$

$$= -e^{x-1} + 2e^{2x-2}$$

ដូចនេះ

$y = -e^{x-1} + 2e^{2x-2}$ ជាចំណើយនៃសមីការ
ឌីផេរ៉ង់ស្យែល

5. គេអោយអនុគមន៍ $f(x) = \frac{ax^2 + bx}{x^2 - 4x + 3}$

ក. រកតម្លៃ a និង b

$$f'(x) = \frac{(2ax + b)(x^2 - 4x + 3) - (ax^2 + bx)(2x - 4)}{(x^2 - 4x + 3)^2}$$

ដោយ f មានតម្លៃអប្បបរមាស្មើ 4 ត្រង់ $x = 2$

គេបាន $\begin{cases} f'(2) = 0 \\ f(2) = 4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -(4a + b) = 0 \\ -(4a + 2b) = 4 \end{cases}$ ត្រូវតែ $f''(x_0) > 0$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} -4a - b = 0 \\ 4a + 2b = -4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 1 \\ b = -4 \end{cases}$$

ដូចនេះ $a = 1; b = -4$

ខ. សិក្សាទិសដៅអថេរភាព និង សង់ខ្សែកោងនៃអនុគមន៍ f

$$f(x) = \frac{x^2 - 4x}{x^2 - 4x + 3}$$

ដែនកំណត់ $D_f = \mathbb{R} - \{1, 3\}$

ទិសដៅអថេរភាព

$$f'(x) = \frac{(2x - 4)(x^2 - 4x + 3) - (2x - 4)(x^2 - 4x)}{(x^2 - 4x + 3)^2}$$

$$= \frac{(2x-4)(x^2-4x+3-x^2+4x)}{(x^2-4x+3)^2}$$

$$= \frac{3(2x-4)}{(x^2-4x+3)^2}$$

ដោយ $(x^2-4x+3)^2 > 0, \forall x \in D_f$

នោះ $f'(x)$ មានសញ្ញាដូច $2x-4$ ។

$$\text{បើ } f'(x) = 0 \Leftrightarrow 2x-4=0 \Rightarrow x=2$$

សញ្ញានៃ $f'(x)$

x	$-\infty$	1	2	3	$-\infty$
$f'(x)$	-	-	0	+	+

តម្លៃបរមា: $x=2 ; f(2)=4$

លីមីត និង អាស៊ីមតូត

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{x^2-4x}{x^2-4x+3} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{x^2}{x^2} = 1$$

$\Rightarrow$ បន្ទាត់ $y=1$ ជាអាស៊ីមតូតដេកនៃក្រាប (c) ។

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 4x}{x^2 - 4x + 3} = \frac{-3}{0} = \pm\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 4x}{x^2 - 4x + 3} = \frac{-3}{0} = \pm\infty$$

ដោយ $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \pm\infty$ និង $\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = \pm\infty$

$\Rightarrow$ បន្ទាត់ $x = 1$ និង $x = 3$ ជាអាស៊ីមតូតឈរនៃក្រាប (c) ។


តារាងអថេរភាពនៃ f

x	$-\infty$	1	2	3	$+\infty$
$f'(x)$	-	-	0	+	+
$f(x)$	$1 \searrow -\infty$	$+\infty \searrow 4$	$4 \nearrow +\infty$	$+\infty \nearrow -\infty$	1

សង់ខ្សែកាង (c)

$$\text{រក } (c) \cap (x'ox) : y = 0 : x^2 - 4x = 0$$

$$\Rightarrow x = 0, x = 4$$



6. តេមាន $(\alpha) : 3x - 2y + 2z - 5 = 0$

$(\beta) : 4x + 5y - z + 1 = 0$

ស្រាយបញ្ជាក់ថាប្លង់ (α) និង ប្លង់ (β) អន្តរក្នុងគ្នា

ដោយប្លង់ (α) មានវ៉ិចទ័រណរម៉ាល់ $\vec{n}_1(3; -2; 2)$

ប្លង់ (β) មានវ៉ិចទ័រណរម៉ាល់ $\vec{n}_2(4; 5; -1)$

គេបាន $\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2 = 12 - 10 - 2 = 0$

ដោយ $\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2 = 0 \Rightarrow \vec{n}_1 \perp \vec{n}_2 \quad (1)$

$$\text{ម្យ៉ាងទៀត} \begin{cases} (\alpha) \perp \vec{n}_1 \\ (\beta) \perp \vec{n}_2 \end{cases} \quad (2)$$

តាម (1) និង (2) បង្ហាញថា $(\alpha) \perp (\beta)$

ដូចនេះ បង្ហាញថាប្លង់ (α) អនុកូណាល់នឹងប្លង់ (β) ។

ខ. សរសេរសមីការបន្ទាត់ប៉ារ៉ាម៉ែត្រប្រសព្វនៃប្លង់ (α) និងប្លង់ (β)

$$\begin{cases} 3x - 2y + 2z - 5 = 0 \\ 4x + 5y - z + 1 = 0 \end{cases} \times 2$$

$$11x + 8y - 3 = 0$$

តាង $x = t ; (t \in R)$

$$\Rightarrow y = \frac{3 - 11t}{8} = \frac{3}{8} - \frac{11}{8}t$$

$$4t + 5\left(\frac{3}{8} - \frac{11}{8}t\right) - z + 1 = 0$$

$$4t + \frac{15}{8} - \frac{55}{8}t - z + 1 = 0$$

$$\frac{32t - 55t}{8} - z + \frac{15 + 8}{8} = 0$$

$$\frac{-23t}{8} - z + \frac{23}{8} = 0$$

$$z = \frac{23}{8} - \frac{23}{8}t$$

ដូចនេះ សមីការបន្ទាត់ប៉ារ៉ាម៉ែត្រិក

$$(d): x = t; y = \frac{3}{8} - \frac{11}{8}t; z = \frac{23}{8} - \frac{23}{8}t, (t \in R)$$

7. បង្ហាញថា $\vec{OC} = \frac{\vec{OA} + k \cdot \vec{OB}}{k+1}$

គេមាន $\vec{AC} = k \cdot \vec{CB}$

$$\vec{AO} + \vec{OC} = k \cdot (\vec{CO} + \vec{OB})$$

$$\vec{OC} - \vec{OA} = k(\vec{OB} - \vec{OC})$$

$$\vec{OC} - \vec{OA} = k \cdot \vec{OB} - k \cdot \vec{OC}$$

$$k \cdot \vec{OC} + \vec{OC} = \vec{OA} + k \cdot \vec{OB}$$

$$(k+1)\vec{OC} = \vec{OA} + k \cdot \vec{OB}$$

$$\Rightarrow \vec{OC} = \frac{\vec{OA} + k \cdot \vec{OB}}{k+1}$$

ដូចនេះ បង្ហាញថា

$$\vec{OC} = \frac{\vec{OA} + k \cdot \vec{OB}}{k+1}$$

វិញ្ញាសាទី៣

ប្រឡងជ្រើសរើសគ្រូមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិ

សម័យប្រឡង: ១៧ តុលា ២០០៤

រយៈពេល: ២ ម៉ោង



1. ក. រកចំនួនពិត x និង y ដើម្បីបំពេញលក្ខខណ្ឌ:

$$(x + y) + (2x - y)i = 2 - 5i$$

ខ. ចូរសរសេរ $(1 + i\sqrt{3})^{10}$ ជា $a + bi$ ។

2. ក. រកក្រឡាផ្ទៃ S ដែលកំណត់ដោយខ្សែកោង: $y = \sin x$

ដោយ $0 \leq x \leq 3\pi$ ជាមួយអ័ក្សអាប់ស៊ីស ។

* ខ. គណនាអាំងតេក្រាលមិនកំណត់:

$$I = \int x \cos x dx \quad , \quad J = \int \frac{5}{5x - 7} dx$$

3. ✓ ក្នុងតំរុយអរតូណរម៉ាល់ គេមានចំណុចបី : $A(1;4;2)$, $B(2;1;3)$

និង $C(-2;2;-1)$ ។ គណនាផ្ទៃក្រឡា ΔABC រួចបង្ហាញថាត្រី

កោណ ABC ជាត្រីកោណកែង ។

44. គេសរសេរលេខ $1;2;3;4;5;6;7;8;9$ រៀងគ្នាលើកាក់ 9 ។
 គេចាប់យកកាក់នេះម្តងមួយៗពីចង្កំទំនួន 3 កាក់ មកតំរៀបតាមលំដាប់ដែលចាប់បាន ។

ក. រកប្រូបាបដើម្បីអោយកាក់ទាំងបីដែលចាប់បាន បង្កើតបានជាចំនួន 123 ។

ខ. រកប្រូបាបដើម្បីអោយកាក់ទាំងបីដែលចាប់បាន បង្កើតបានជាចំនួនចែកដាច់នឹង 125 ។

5. គណនាតម្លៃអតិបរមា អប្បបរមា និង ចំណុចរបត់របស់ខ្សែកោងតាងអនុគមន៍ $y = 3xe^{-x^2}$ រួចសង់ខ្សែកោង (c) តាងអនុគមន៍

6. គេអោយសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល (E) : $y' + 2y = x^2$ ។

ក. កំណត់អនុគមន៍ពហុធា g មានសមីការដឺក្រេទី 2 ជាចំលើយសមីការ (E) ។

ខ. បង្ហាញថាអនុគមន៍ f ជាចំលើយនៃសមីការ (E) លុះត្រាតែ $f - g$ ជាចំលើយនៃសមីការ (E') : $y' + 2y = 0$ ។

គ. ដោះស្រាយសមីការ (E') ។ ទាញរកចំលើយនៃសមីការ (E) ។

ចំណេះ

1. ក. រកចំនួនពិត x និង y

$$\text{គេមាន } (x + y) + (2x - y)i = 2 - 5i$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x + y = 2 \\ 2x - y = -5 \end{cases} +$$

$$3x = -3$$

$$\Rightarrow x = -1$$

$$\Rightarrow y = 2 + 1 = 3$$

ដូចនេះ

$$x = -1; y = 3$$

ខ. សរសេរ $(1 + i\sqrt{3})^{10}$ ជា $a + bi$

$$\text{គេមាន } 1 + i\sqrt{3} = 2\left(\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$$

$$= 2\left(\cos\frac{\pi}{3} + i\sin\frac{\pi}{3}\right)$$

$$\begin{aligned} \text{គេបាន } (1 + i\sqrt{3})^{10} &= \left[2\left(\cos\frac{\pi}{3} + i\sin\frac{\pi}{3}\right)\right]^{10} \\ &= 2^{10}\left(\cos\frac{10\pi}{3} + i\sin\frac{10\pi}{3}\right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= 2^{10} \left[\cos\left(3\pi + \frac{\pi}{3}\right) + i \sin\left(3\pi + \frac{\pi}{3}\right) \right] \\
&= 2^{10} \left(-\cos \frac{\pi}{3} - i \sin \frac{\pi}{3} \right) \\
&= 2^{10} \left(-\frac{1}{2} - i \frac{\sqrt{3}}{2} \right) \\
&= -2^9 - 2^9 \sqrt{3}i
\end{aligned}$$

ដូចនេះ

$$(1 + i\sqrt{3})^{10} = -2^9 - 2^9 \sqrt{3}i$$

2. ក. រកផ្ទៃក្រឡា S

$$S = \int_0^{3\pi} |\sin x| dx$$

x	0	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π	$\frac{5\pi}{2}$	3π
$ \sin x $	$\sin x$	$\sin x$	$-\sin x$	$-\sin x$	$\sin x$	$\sin x$	$\sin x$

$$\text{គេបាន } S = \int_0^{3\pi} |\sin x| dx = \int_0^{\pi/2} \sin x dx + \int_{\pi/2}^{\pi} \sin x dx + \int_{\pi}^{3\pi/2} \sin x dx + \int_{3\pi/2}^{2\pi} \sin x dx + \int_{2\pi}^{5\pi/2} \sin x dx + \int_{5\pi/2}^{3\pi} \sin x dx$$

$$- \int_{\pi}^{3\pi/2} \sin x dx - \int_{3\pi/2}^{2\pi} \sin x dx + \int_{2\pi}^{5\pi/2} \sin x dx$$

$$+ \int_{5\pi/2}^{3\pi} \sin x dx = (-\cos x) \Big|_0^{\pi/2} + (-\cos x) \Big|_{\pi/2}^{\pi}$$

$$- (-\cos x) \Big|_{\pi}^{3\pi/2} - (-\cos x) \Big|_{3\pi/2}^{2\pi} + (-\cos x) \Big|_{2\pi}^{5\pi/2}$$

$$+ (-\cos x) \Big|_{5\pi/2}^{3\pi} = (0 + 1) + (1 - 0) - (0 - 1) - (-1 + 0)$$

$$+ (0 + 1) + (1 + 0) = 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 = 6$$

ដូចនេះ

$$S = 6 \text{ (ឯកតាផ្ទៃ)}$$

ខ. គណនាអាំងតេក្រាលមិនកំណត់:

$$I = \int x \cos x dx$$

$$\text{តាង } u = x \Rightarrow du = dx$$

$$dv = \cos x dx = v = \sin x$$

$$\text{តាមរូបមន្ត } \int u dv = uv - \int v du$$

$$\text{គេបាន } I = \int x \cos x dx = x \sin x - \int \sin x dx$$

$$= x \sin x + \cos x + c$$

ដូចនេះ

$$I = x \sin x + \cos x + c$$

$$J = \int \frac{5}{5x-7} dx = \ln|5x-7| + c$$

ដូចនេះ

$$J = \ln|5x-7| + c$$

3. គណនាផ្ទៃក្រឡាត្រីកោណ ABC

គេមាន $\vec{AB}(1;-3;1)$, $\vec{AC}(-3;-2;-3)$

$$\text{បោះ } \vec{AB} \times \vec{AC} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & -3 & 1 \\ -3 & -2 & -3 \end{vmatrix} = 11\vec{i} - 11\vec{j}$$

$$S_{ABC} = \frac{1}{2} \|\vec{AB} \times \vec{AC}\|$$

$$\text{ដោយ } \|\vec{AB} \times \vec{AC}\| = \sqrt{11^2 + (-11)^2} = 11\sqrt{2}$$

$$\Rightarrow S_{ABC} = \frac{11\sqrt{2}}{2}$$

ដូចនេះ

$$S = \frac{11\sqrt{2}}{2} \text{ (ឯកតាផ្ទៃ)}$$

បង្ហាញថាត្រីកោណ ABC ជាត្រីកោណកែង

$$\vec{AB} \cdot \vec{AC} = -3 + 6 - 3 = 0$$

$$\text{ដោយ } \vec{AB} \cdot \vec{AC} = 0 \Rightarrow \vec{AB} \perp \vec{AC} \text{ ត្រង់ } A$$

ដូចនេះ បង្ហាញថាត្រីកោណ ABC ជាត្រីកោណកែងត្រង់ A ។

4. ក. រកប្រូបាបដើម្បីអោយកាក់ទាំង៣ ដែលចាប់បាន

បង្កើតបានជាចំនួន 123

តាង A ជាព្រឹត្តិការណ៍ចាប់បានកាក់ដែលចុះលេខ 1

B ជាព្រឹត្តិការណ៍ចាប់បានកាក់ដែលចុះលេខ 2

C ជាព្រឹត្តិការណ៍ចាប់បានកាក់ដែលចុះលេខ 3

ដោយព្រឹត្តិការណ៍ទាំងបីជាព្រឹត្តិការណ៍ទាក់ទងគ្នា

$$\begin{aligned}\text{គេបាន: } P(123) &= P(A) \times P\left(\frac{B}{A}\right) \times P\left(\frac{C}{AB}\right) \\ &= \frac{1}{9} \times \frac{1}{8} \times \frac{1}{7} = \frac{1}{504} = 0,002\end{aligned}$$

ដូចនេះ

$$P(123) = 0,002$$

ខ. រកប្រូបាបដើម្បីអោយកាក់ទាំង៣ ដែលចាប់បាន

បង្កើតបានជាចំនួនដែលចែកដាច់នឹង 125

តាង E ជា " ព្រឹត្តិការណ៍ដែលចាប់បានកាក់ទាំង៣ បង្កើតបានជាចំនួនដែលចែកដាច់នឹង 125 "

ដោយគេចាប់យកកាក់ម្តងមួយៗចំនួន 3 គេបាន:

ករណីអាច $n(S) = C(9;1) \times C(8;1) \times C(7;1)$

$$= 9 \times 8 \times 7 = 504$$

ចំនួនដែលចែកដាច់នឹង 125 គឺជាពហុគុណនៃ 125 ។ ចំនួនទាំងនោះ រួមមាន: 125; 250; 375; 500; 625; 750 និង 875 ។ ដោយគេ ដឹងថានៅលើកាក់គ្មានចុះលេខ 0 ទេ ដូច្នេះចំនួនដែលចែកដាច់នឹង 125 មានតែ 125; 375; 625 និង 875 គេបាន:

ករណីស្រប $n(E) = 4$

$$\Rightarrow P(E) = \frac{n(E)}{n(S)} = \frac{4}{504} = 0,008$$

ដូចនេះ $P(E) = 0,008$

5. គណនាតម្លៃអតិបរមា អប្បបរមា និងចំណុចរបត់ រួចសង្ខេប (c)

$$y = f(x) = 3xe^{-x^2}$$

$$\begin{aligned} \forall x \in R \Rightarrow f'(x) &= 3e^{-x^2} - 2x \cdot 3xe^{-x^2} \\ &= (3 - 6x^2)e^{-x^2} \end{aligned}$$

ដោយ $e^{-x^2} > 0, \forall x \in R$ នោះ $f'(x)$ មានសញ្ញាដូច $3 - 6x^2$

បើ $f'(x) = 0$ នោះ $3 - 6x^2 = 0$

$$6x^2 = 3$$

$$x^2 = \frac{1}{2}$$

$$x = \pm \frac{\sqrt{2}}{2}$$

សញ្ញានៃ $f'(x)$

x	$-\infty$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$+\infty$	
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$

ត្រង់ $x = \frac{-\sqrt{2}}{2}$ ធ្វើអោយ $f'(x) = 0$ ហើយប្តូរសញ្ញាពី $(-)$

ទៅ $(+)$ នោះ $f(x)$ មានតម្លៃអប្បបរមាត្រង់ $x = \frac{-\sqrt{2}}{2}$ ។

$$f\left(\frac{-\sqrt{2}}{2}\right) = 3\left(\frac{-\sqrt{2}}{2}\right) \cdot e^{-\left(\frac{-\sqrt{2}}{2}\right)^2} = -\frac{3}{2}\sqrt{2} \cdot e^{-\frac{1}{2}}$$

ដូចនេះ តម្លៃអប្បបរមាស្មើនឹង

$$-\frac{3}{2}\sqrt{2} \cdot e^{-\frac{1}{2}}$$

ត្រង់ $x = \frac{\sqrt{2}}{2}$ ធ្វើអោយ $f'(x) = 0$ ហើយប្តូរសញ្ញាពី (+)

ទៅ (-) នោះ $f(x)$ មានតម្លៃអតិបរមាត្រង់ $x = \frac{\sqrt{2}}{2}$ ។

$$f\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = 3\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)e^{-\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2} = \frac{3}{2}\sqrt{2} \cdot e^{-\frac{1}{2}}$$

ដូចនេះ តម្លៃអតិបរមាស្មើនឹង

$$\frac{3}{2}\sqrt{2} \cdot e^{-\frac{1}{2}}$$

$$f''(x) = -12x \cdot e^{-x^2} + (3 - 6x^2)(-2x)e^{-x^2}$$

$$= -12x \cdot e^{-x^2} - (6x - 12x^3)e^{-x^2}$$

$$= -18x \cdot e^{-x^2} + 12x^3 \cdot e^{-x^2}$$

$$= (-18x + 12x^3)e^{-x^2}$$

$$\text{បើ } f''(x) = 0 ; (-18x + 12x^3)e^{-x^2} = 0$$

$$-18x + 12x^3 = 0$$

$$x(-18 + 12x^2) = 0$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x = 0 \\ -18 + 12x^2 = 0 \end{cases}$$

$$x^2 = \frac{18}{12} = \frac{3}{2}$$

$$x = \pm \sqrt{\frac{3}{2}}$$

បើ $x = 0; f(0) = 0$

$$x = -\sqrt{\frac{3}{2}}; f\left(-\sqrt{\frac{3}{2}}\right) = -\frac{3\sqrt{3}}{\sqrt{2}} \cdot e^{-\frac{3}{2}}$$

$$x = \sqrt{\frac{3}{2}}; f\left(\sqrt{\frac{3}{2}}\right) = \frac{3\sqrt{3}}{\sqrt{2}} \cdot e^{-\frac{3}{2}}$$

ដូចនេះ ចំណុចរបស់នៃអនុគមន៍មានបីគឺ

$$\therefore (0;0), \left(-\sqrt{\frac{3}{2}}; -\frac{3\sqrt{3}}{\sqrt{2}} \cdot e^{-\frac{3}{2}}\right) \text{ និង } \left(\sqrt{\frac{3}{2}}; \frac{3\sqrt{3}}{\sqrt{2}} \cdot e^{-\frac{3}{2}}\right)$$

គណនាលីមីតចុងដែនកំណត់

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} 3x \cdot e^{-x^2} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} 3x \cdot e^{-x^2} = 0$$


ដោយ $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} = 0 \Rightarrow$ បន្ទាត់ $y = 0$ ជាអាស៊ីមតូតដេកនៃក្រាប(c)

តារាងអថេរភាព

x	$-\infty$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$+\infty$
$f'(x)$	-	0	0	-
$f(x)$	0	f_m	f_M	0

សង់ក្រាប (c)

$$\text{តម្លៃបរមា} -\frac{3}{2}\sqrt{2} \cdot e^{-\frac{1}{2}} = -1,27; \quad \frac{3}{2}\sqrt{2} \cdot e^{-\frac{1}{2}} = 1,27$$



6. គេអោយសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល $(E) : y' + 2y = x^2$

ក. កំណត់អនុគមន៍ពហុធា g ដឺក្រេទី 2 ជាចំលើយសមីការ (E)

$$g(x) = ax^2 + bx + c$$

$$\Rightarrow g'(x) = 2ax + b$$

ដោយ $g(x)$ ជាចំលើយនៃ (E) គេបាន:

$$g'(x) + 2g(x) = x^2$$

$$2ax + b + 2(ax^2 + bx + c) = x^2$$

$$2ax^2 + (2a + 2b)x + b + 2c = x^2$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 2a = 1 \\ 2a + 2b = 0 \\ b + 2c = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = \frac{1}{2} \\ b = -\frac{1}{2} \\ c = \frac{1}{4} \end{cases}$$

✦ គេបាន $g(x) = \frac{x^2}{2} - \frac{x}{2} + \frac{1}{4}$

ដូចនេះ

$$g(x) = \frac{x^2}{2} - \frac{x}{2} + \frac{1}{4}$$

២. បង្ហាញថាអនុគមន៍ f ជាចំណេញនៃ (E) លុះត្រាតែ $f - g$

ជាចំណេញនៃសមីការ $(E') : y' + 2y = 0$

បើ $f - g$ ជាចំណេញនៃ (E') គេបាន:

$$(f - g)' + 2(f - g) = 0$$

$$f' - g' + 2f - 2g = 0$$

$$f' + 2f = g' + 2g$$

$$\Rightarrow f = g$$

តែ g ជាចំណេញនៃ (E) នោះនាំអោយ f ក៏ជាចំណេញនៃ (E) ដែរ

ដូចនេះ បង្ហាញថាអនុគមន៍ f ជាចំណេញនៃ (E) លុះត្រាតែ $f - g$

ជាចំណេញនៃសមីការ (E') ។

គ. ដោះស្រាយសមីការ (E')

$$y' + 2y = 0$$

$$\Rightarrow y = ke^{-2x}; \quad (k \text{ ជាចំនួនពិត})$$

ដូចនេះ $y = ke^{-2x}; (k \in R)$ ជាចំណេញទូទៅនៃសមីការ (E')

ទាញរកចំណេញនៃសមីការ (E)

$$\text{ដោយ } f - g = ke^{-2x}$$

$$f(x) - g(x) = ke^{-2x}$$

$$f(x) = \frac{x^2}{2} - \frac{x}{2} + \frac{1}{4} + ke^{-2x} \quad (k \in R)$$

ដូចនេះ

$$f(x) = \frac{x^2}{2} - \frac{x}{2} + \frac{1}{4} + ke^{-2x} \text{ ជាចំណេញទូទៅនៃ } (E)$$

វិញ្ញាសាទី៤

ប្រឡងជ្រើសរើសគ្រូមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិ

សម័យប្រឡង: ០៣ វិច្ឆិកា ២០០៥

រយៈពេល: ២ ម៉ោង



1. ក. សរសេរចំនួនកុំផ្លិចជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ $-2-2i$

ខ. ដោះស្រាយសមីការក្នុងសំណុំកុំផ្លិច

$$(2+i)x^2 - (5-i)x + 2 - 2i = 0$$

2. ក. គណនាអាំងតេក្រាលមិនកំណត់

$$I = \int (2 \sin x + 3 \cos x) dx, \quad J = \int \frac{dx}{x^2 - 5x + 6}$$

ខ. រកព្រីមីទីវ $F(x)$ នៃអនុគមន៍ $f(x) = x^2 - e^x$

$$\text{ដែល } F(0) = 1$$

3. ក. ដោះស្រាយសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល $(E): y'' - 3y' + 2y = 0$

ខ. រកចំលើយនៃសមីការ (E) ពេញលេញអនុគមន៍ចំលើយមាន

អតិបរមាស្មើ 1 ត្រង់ $x = 1$ ។

4. សរសេរសមីការប្លង់(P)ដែលកាត់តាមចំណុច $M(1;2;-3)$ និង ស្របជាមួយប្លង់ (Q): $2x - 4y - z + 4 = 0$ រួចគណនាចម្ងាយ រវាងប្លង់ទាំងពីរ ។

5. គេមានតួលេខ $0;1;2;3;4$ ។ ដោយគ្រាន់តែប្រើតួលេខទាំងនោះ តើគេអាចបង្កើតចំនួនបានប៉ុន្មាន ដែលធំជាង 2000 ?
(បញ្ជាក់: ក្នុងចំនួននីមួយៗគ្មានតួលេខដដែលពីរដងទេ)

6. គេអោយអនុគមន៍ $f(x) = ae^x + b$ មានខ្សែកោង (c)

ក. កំណត់តម្លៃ a និង b ដើម្បីអោយខ្សែកោង (c) កាត់តាម គល់ O នៃតំរុយអរតូណរមេ និងបន្ទាត់ប៉ះខ្សែកោង (c) ត្រង់ ចំណុចនេះជាបន្ទាត់ពុះទី1

ខ. សិក្សាទិសដៅអថេរភាព និង គូសខ្សែកោង(c) តាងអនុគមន៍ f ចំពោះតម្លៃ a និង b ដែលរកឃើញ

គ. គណនាផ្ទៃក្រឡាផ្នែកនៃប្លង់ដែលខណ្ឌដោយខ្សែកោង(c)

អ័ក្ស ($x'ox$) បន្ទាត់ $x = -1$ និង បន្ទាត់ $x = 1$ ។

ចំណើយ

1. ក. សរសេរចំនួនកុំផ្លិចជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ $-2-2i$

$$\text{តាង } Z = -2 - 2i$$

$$= 2\sqrt{2} \left(-\frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2}i \right)$$

$$= 2\sqrt{2} \left(\cos \frac{5\pi}{4} + i \sin \frac{5\pi}{4} \right)$$

ដូចនេះ

$$Z = 2\sqrt{2} \left(\cos \frac{5\pi}{4} + i \sin \frac{5\pi}{4} \right)$$

ខ. ដោះស្រាយសមីការក្នុងសំណុំកុំផ្លិច

$$(2+i)x^2 - (5-i)x + 2-2i = 0$$

$$\Delta = b^2 - 4ac = (5-i)^2 - 4(2+i)(2-2i)$$

$$= (25 - 10i - 1) - 4(4 - 4i + 2i + 2)$$

$$= 24 - 10i - 24 + 8i = -2i$$

$$= 1 - 2i - 1 = (1-i)^2$$

$$\Rightarrow x_1 = \frac{(5-i) - (1-i)}{2(2+i)} = \frac{4}{2(2+i)}$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{2}{(2+i)} = \frac{2(2-i)}{4+1} = \frac{4-2i}{5} \\
 \Rightarrow x_2 &= \frac{(5-i) + (1-i)}{2(2+i)} = \frac{6-2i}{2(2+i)} \\
 &= \frac{3-i}{2+i} = \frac{(3-i)(2-i)}{4+1} = \frac{6-1-2i-3i}{5} \\
 &= \frac{5-5i}{5} = 1-i
 \end{aligned}$$

ដូចនេះ

$$x_1 = \frac{4-2i}{5}; x_2 = 1-i$$

2. ក. គណនាអាំងតេក្រាលមិនកំណត់

$$I = \int (2 \sin x + 3 \cos x) dx$$

$$= -2 \cos x + 3 \sin x + c$$

ដូចនេះ

$$I = -2 \cos x + 3 \sin x + c$$

$$\begin{aligned}
 J &= \int \frac{dx}{x^2 - 5x + 6} \\
 &= \int \frac{dx}{(x-2)(x-3)} \\
 &= \int \left(\frac{-1}{x-2} + \frac{1}{x-3} \right) dx \\
 &= -\ln|x-2| + \ln|x-3| + c \\
 &= \ln \left| \frac{x-3}{x-2} \right| + c
 \end{aligned}$$

ដូចនេះ

$$J = \ln \left| \frac{x-3}{x-2} \right| + c$$

ខ. រកព្រីមីទីវ $F(x)$ នៃអនុគមន៍ $f(x) = x^2 - e^x$

$$\begin{aligned}
 F(x) &= \int f(x) dx \\
 &= \int (x^2 - e^x) dx = \frac{1}{3}x^3 - e^x + c
 \end{aligned}$$

ដោយ $F(0) = 1; \frac{1}{3} \cdot 0^3 - e^0 + c = 1$

$$c - 1 = 1 \Rightarrow c = 2$$

ដូចនេះ

$$F(x) = \frac{1}{3}x^3 - e^x + 2$$

3. ក. ដោះស្រាយសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល

$$(E): y'' - 3y' + 2y = 0$$

$$\text{មានសមីការសំគាល់ } r^2 - 3r + 2 = 0$$

$$\text{ចូលរាង } a + b + c = 0 \text{ គឺ } 1 - 3 + 2 = 0$$

$$\Rightarrow r_1 = 1; r_2 = \frac{c}{a} = 2$$

$$\text{គេបាន } y = Ae^x + Be^{2x}; (A, B \in \mathbb{R})$$

ដូចនេះ

$$y = Ae^x + Be^{2x} \text{ ជាចំណើយទូទៅនៃសមីការ}(E)$$

ខ. រកចំណើយនៃសមីការ(E)

$$f(x) = Ae^x + Be^{2x}$$

$$\Rightarrow f'(x) = Ae^x + 2Be^{2x}$$

ដោយអនុគមន៍ចំណេញមានអតិបរមាស្មើ 1 ត្រង់ $x=1$

គេបាន:
$$\begin{cases} f'(1) = 0 \\ f(1) = 1 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} Ae + 2Be^2 = 0 \\ Ae + Be^2 = 1 \end{cases} \times (-1)$$

$$Be^2 = -1 \Rightarrow B = -e^{-2}$$

$$\Rightarrow A = \frac{2}{e} = 2e^{-1}$$

ដូចនេះ

$$f(x) = 2e^{x-1} - e^{2x-2}$$

4. សរសេរសមីការប្លង់(P)

(Q): $2x - 4y - z + 4 = 0$ មានវ៉ិចទ័រណរម៉ាល់ $\vec{n}(2; -4; -1)$

ដោយ
$$\frac{(Q) \perp \vec{n}}{(P) \parallel (Q)} \Rightarrow (P) \perp \vec{n}$$

ប្លង់ (P) កាត់តាមចំណុច $M(1; 2; -3)$ ហើយ

កែងនឹង $\vec{n}(2; -4; -1)$ កំណត់ដោយ:

$$(P): 2(x-1) - 4(y-2) - (z+3) = 0$$

$$2x - 4y - z - 2 + 8 - 3 = 0$$

$$2x - 4y - z + 3 = 0$$

ដូចនេះ : $(P) : 2x - 4y - z + 3 = 0$

គណនាចម្ងាយរវាងប្លង់ (P) និងប្លង់ (Q)

$$d((P), (Q)) = \|\vec{n}\|$$

គេមាន $\vec{n}(2; -4; -1)$

$$\Rightarrow \|\vec{n}\| = \sqrt{2^2 + (-4)^2 + (-1)^2}$$

$$= \sqrt{4 + 16 + 1} = \sqrt{21}$$

ដូចនេះ :

$$d((P), (Q)) = \sqrt{21} \text{ (ឯកតាប្រវែង)}$$

5. រកចំនួនករណីដែលគេអាចបង្កើតបានចំនួនដែលធំជាង 2000

-ខ្ទង់ពាន់មានជំរើស 3 ករណី

-ខ្ទង់រយមានជំរើស 4 ករណី

-ខ្ទង់ដប់មានជំរើស 3 ករណី

-ខ្ទង់រាយមានជំរើស 2 ករណី

$$\text{គេបានចំនួនករណីសរុប} = 3 \times 4 \times 3 \times 2 = 72$$

ដូចនេះ គេអាចបង្កើតចំនួនដែលធំជាង 2000 បានចំនួន 72 របៀប ។

6. គេអោយអនុគមន៍ $f(x) = ae^x + b$ មានខ្សែកោង (c)

ក. កំណត់តំលៃ a និង b

$$f(x) = ae^x + b$$

$$\Rightarrow f'(x) = ae^x$$

ដើម្បីអោយខ្សែកោង (c) កាត់តាមគល់ O នៃតំរុយហើយ

បន្ទាត់ប៉ះនៃខ្សែកោង (c) ត្រង់ចំណុចនេះជាកន្លះបន្ទាត់ពុះទី 1

លុះត្រាតែ:

$$\begin{cases} f(0) = 0 \\ f'(0) = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a + b = 0 \\ a = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 1 \\ b = -1 \end{cases}$$

ដូចនេះ $a = 1; b = -1$

ខ. សិក្សាទិសដៅអថេរភាព និងគូសខ្សែកោង (c) តាង f

$$(c): f(x) = e^x - 1$$

ដែនកំណត់ $D_f = R$

ទិសដៅអថេរភាព

$$f'(x) = e^x$$

ដោយ $e^x > 0, \forall x \in D_f$ នោះ $f'(x) > 0$ ជានិច្ច

លីមីត និង អាស៊ីមតូត

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} (e^x - 1) = -1$$

$\Rightarrow$ បន្ទាត់ $y = -1$ ជាអាស៊ីមតូតដេកនៃក្រាប (c) ។

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (e^x - 1) = +\infty$$

តារាងអថេរភាពនៃ $f(x)$


x	$-\infty$	$+\infty$
$f'(x)$	+	
$f(x)$	-1	$+\infty$



សង់ខ្សែកោង (c)

តារាងតំលៃលេខជំនួយ

x	-1	1
y	$-0,6$	$1,7$



គ. គណនាក្រឡាផ្ទៃ S

$$S = S_1 + S_2 = \int_0^1 (e^x - 1) dx - \int_{-1}^0 (e^x - 1) dx$$

$$\begin{aligned}
&= \int_0^1 (e^x - 1) dx + \int_0^{-1} (e^x - 1) dx \\
&= (e^x - x) \Big|_0^1 + (e^x - x) \Big|_0^{-1} \\
&= (e - 1 - 1) + (e^{-1} + 1 - 1) \\
&= e + \frac{1}{e} - 2
\end{aligned}$$

ដូចនេះ

$$S = \left(e + \frac{1}{e} - 2 \right) (\text{ឯកតាផ្ទៃ})$$

វិញ្ញាសាទី៥

ប្រឡងជ្រើសរើសគ្រូមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិ

សម័យប្រឡង: ១៦ តុលា ២០០៧

រយៈពេល: ២ ម៉ោង



1. ក. កំណត់ចំនួនពិត x និង y ដើម្បីអោយ:

$$2xi - y = \frac{(3 - 2i)(1 + i)}{i(1 + 2i)}$$

ខ. គេអោយ $Z = \cos \frac{2\pi}{9} + i \sin \frac{2\pi}{9}$ ។ សរសេរ $(1 + Z)^4$

ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ ។

2. ក. ដោះស្រាយសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល

$$(E): g''(x) - 5g'(x) + 6g(x) = 0$$

ខ. កំណត់ចំលើយ $g(x)$ មួយនៃសមីការ (E) ដែល $g(0) = 0$

និង $g'(0) = 1$ ។

3. គេអោយអនុគមន៍ f កំណត់ដោយ $f(x) = \frac{1 - \cos 2x}{x^2}$.

ចំពោះ $x \neq 0$ និង $f(0) = \ln(m-1)$ ។ គណនាលីមីត $f(x)$
 កាលណា x ខិតជិតសូន្យ ។ កំណត់តម្លៃ m ដើម្បីអោយ f ជា
 អនុគមន៍ជាប់ត្រង់ $x=0$ ។

4. ក្នុងថង់មួយមានឃ្លីស3 និងឃ្លីខ្មៅ5 ។

គេចាប់យកឃ្លីម្តងបីចេញពី

ក្នុងថង់ ។ រកប្រូបាបដែលគេអាចចាប់យកបានឃ្លីស2 និងឃ្លីខ្មៅ1

5. គេអោយអនុគមន៍ $g(x) = \frac{x^2 - 3x - 4}{x - 2}$ មានក្រាប (c) ។

ក. កំណត់ចំនួនពិត $a; b; c$ ដើម្បីអោយ

$$g(x) = ax + b + \frac{c}{x-2} \quad \text{ចំពោះ } x \neq 2$$

ខ. រកសមីការអាស៊ីមតូតឈរ និងទ្រេតនៃក្រាប (c)

គ. បង្ហាញថាចំណុច $I(2;1)$ ជាផ្ចិតឆ្លុះនៃក្រាប (c)

6. ក្នុងលំហប្រដាប់ដោយតំរុយអរតូណរម៉ាល់វិជ្ជមាន $(0; \vec{i}; \vec{j}; \vec{k})$

គេអោយប្លង់(P) និងស្វ៊ែរ (S) មានសមីការ:

$$(P): x + 2y + 2z + 5 = 0$$

$$(S): x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 4y + 4z = 0$$

ក. កំណត់កូអរដោនេផ្ចិត និងកាំនៃស្វ៊ី(S)

ខ. បង្ហាញថាប្លង់ (P) កាត់ស្វ៊ី(S)

គ. រកសមីការបណ្តាប្លង់ស្របនឹងប្លង់ (P) ហើយប៉ះស្វ៊ី(S) ។

ចំណើយ

1. ក. កំណត់ចំនួនពិត x និង y ដើម្បីអោយ:

$$\begin{aligned} \text{គេមាន } 2xi - y &= \frac{(3 - 2i)(1 + i)}{i(1 + 2i)} \\ &= \frac{(3 + 3i - 2i + 2)}{(i - 2)} \\ &= \frac{(5 + i)(i + 2)}{1 + 4} \\ &= \frac{5i + 10 - 1 + 2i}{5} \end{aligned}$$

$$= \frac{9+7i}{5} = \frac{9}{5} + \frac{7}{5}i$$

$$2xi - y = \frac{9}{5} + \frac{7}{5}i$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 2x = \frac{7}{5} \\ -y = \frac{9}{5} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{7}{10} \\ y = -\frac{9}{5} \end{cases}$$

ដូចនេះ

$$\boxed{x = \frac{7}{10}; y = -\frac{9}{5}}$$

ខ. សរសេរ $(1+Z)^4$ ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ

$$\begin{aligned} \text{គេមាន: } 1+Z &= 1 + \cos \frac{2\pi}{9} + i \sin \frac{2\pi}{9} \\ &= 2 \cos^2 \frac{\pi}{9} + 2i \sin \frac{\pi}{9} \cos \frac{\pi}{9} \\ &= 2 \cos \frac{\pi}{9} \left(\cos \frac{\pi}{9} + i \sin \frac{\pi}{9} \right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{គេបាន } (1+Z)^4 &= \left[2 \cos \frac{\pi}{9} \left(\cos \frac{\pi}{9} + i \sin \frac{\pi}{9} \right) \right]^4 \\
 &= \left(2 \cos \frac{\pi}{9} \right)^4 \left(\cos \frac{\pi}{9} + i \sin \frac{\pi}{9} \right)^4 \\
 &= 16 \cos^4 \left(\frac{\pi}{9} \right) \left(\cos \frac{4\pi}{9} + i \sin \frac{4\pi}{9} \right)
 \end{aligned}$$

ដូចនេះ

$$(1+Z)^4 = 16 \cos^4 \left(\frac{\pi}{9} \right) \left(\cos \frac{4\pi}{9} + i \sin \frac{4\pi}{9} \right)$$

2. ក. ដោះស្រាយសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល

$$(E): g''(x) - 5g'(x) + 6g(x) = 0$$

មានសមីការសំគាល់:

$$r^2 - 5r + 6 = 0$$

$$\Delta = (-5)^2 - 4 \times 6$$

$$= 25 - 24 = 1$$

$$\Rightarrow r_1 = \frac{5-1}{2} = 2; r_2 = \frac{5+1}{2} = 3$$

គេបាន $g(x) = Ae^{2x} + Be^{3x}, (A, B \in R)$

ដូចនេះ

$$g(x) = Ae^{2x} + Be^{3x} \text{ ជាចំណើយទូទៅនៃសមីការ (E)}$$

ខ. កំណត់ចំណើយ $g(x)$ ដែលផ្ទៀងផ្ទាត់លក្ខខណ្ឌ

$$g(x) = Ae^{2x} + Be^{3x}, (A, B \in R)$$

$$\Rightarrow g'(x) = 2Ae^{2x} + 3Be^{3x}$$

តាមបំរើប៉ះ

$$\begin{cases} g'(0) = 1 \\ g(0) = 0 \end{cases}$$

គេបាន

$$\begin{cases} 2A + 3B = 1 \\ A + B = 0 \end{cases} \times (-3)$$

$$-A = 1 \Rightarrow A = -1$$

$$\Rightarrow B = 1$$

ដូចនេះ

$$g(x) = -e^{2x} + e^{3x}$$

3. គណនាលីមីត $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos 2x}{x^2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \sin^2 x}{x^2} = 2 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 x}{x^2} = 2 \times 1 = 2\end{aligned}$$

ដូចនេះ: $\boxed{\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 2}$

កំណត់តម្លៃ m

ដើម្បីអោយ f ជាប់ត្រង់ $x = 0$ លុះត្រាតែ

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0)$$

$$2 = \ln(m - 1)$$

$$\ln(m - 1) = \ln e^2$$

$$m - 1 = e^2$$

$$\Rightarrow m = e^2 + 1$$

ដូចនេះ: $\boxed{m = e^2 + 1}$

4. រកប្រូបាបដែលគេចាប់បានឃ្លីស2 ឃ្លីខ្មៅ1

ឃ្លីសរុបមានចំនួន 8 ហើយគេចាប់យកម្តង3 គេបានករណីអាច:

$$n(S) = C(8;3) = \frac{8!}{(8-3)!3!} = \frac{6 \times 7 \times 8}{3 \times 2 \times 1} = 56$$

តាង A ជា " ព្រឹត្តិការណ៍ដែលចាប់បានឃ្លីស2 ឃ្លីខ្មៅ1 "

$$n(A) = C(3;2) \times C(5;1) = \frac{3!}{1!2!} \times 5 = 3 \times 5 = 15$$

$$\Rightarrow P(A) = \frac{n(A)}{n(S)} = \frac{15}{56}$$

ដូចនេះ

$$P(A) = \frac{15}{56}$$

5. គេអោយអនុគមន៍ $g(x) = \frac{x^2 - 3x - 4}{x - 2}$ មានក្រាប (c)

ក. កំណត់តម្លៃ a, b និង c

$$\text{គេមាន } g(x) = ax + b + \frac{c}{x - 2}$$

$$= \frac{ax(x-2) + b(x-2) + c}{x-2}$$

$$= \frac{ax^2 - 2ax + bx - 2b + c}{x-2}$$

$$= \frac{ax^2 - (2a-b)x - (2b-c)}{x-2}$$

តែ $g(x) = \frac{x^2 - 3x - 4}{x-2}$

$$\Rightarrow \begin{cases} a=1 \\ 2a-b=3 \\ 2b-c=4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a=1 \\ b=-1 \\ c=-6 \end{cases}$$

ដូចនេះ: $a=1; b=-1; c=-6$

ខ. រកអាស៊ីមតូតឈរ និងអាស៊ីមតូតទ្រេតនៃក្រាប (c).

ដោយ $\lim_{x \rightarrow 2} g(x) = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 3x - 4}{x-2} = \frac{-6}{0} = \pm\infty$

$\Rightarrow$ បន្ទាត់ $x=2$ ជាអាស៊ីមតូតឈរនៃក្រាប(c)

ដូចនេះ: បន្ទាត់ $x=2$ ជាអាស៊ីមតូតឈរនៃក្រាប(c)

$$g(x) = x - 1 + \frac{-6}{x-2}$$

$$\text{ដោយ } \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left(\frac{-6}{x-2} \right) = 0$$

$\Rightarrow$ បន្ទាត់ $y = x - 1$ ជាអាស៊ីមតូតទ្រេតនៃក្រាប(c)

ដូចនេះ

បន្ទាត់ $y = x - 1$ ជាអាស៊ីមតូតទ្រេតនៃក្រាប(c)

គ. បង្ហាញថាចំណុច $I(2;1)$ ជាផ្ចិតឆ្លុះនៃក្រាប (c)

បើ $I(2;1)$ ជាផ្ចិតឆ្លុះនៃក្រាប (c) លុះត្រាតែ

$$g(4-x) + g(x) = 2$$

$$\text{គណនា } g(4-x) + g(x)$$

$$= \frac{(4-x)^2 - 3(4-x) - 4}{(4-x) - 2} + g(x)$$

$$= \frac{16 - 8x + x^2 - 12 + 3x - 4}{-x + 2} + g(x)$$

$$= \frac{x^2 - 5x}{-(x-2)} + \frac{x^2 - 3x - 4}{x-2}$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{-(x^2 - 5x) + (x^2 - 3x - 4)}{x - 2} \\
 &= \frac{-x^2 + 5x + x^2 - 3x - 4}{x - 2} \\
 &= \frac{2x - 4}{x - 2} = \frac{2(x - 2)}{(x - 2)} = 2
 \end{aligned}$$

ដូចនេះ

បង្ហាញថាចំណុច $I(2;1)$ ជាផ្ចិតឆ្លុះនៃក្រាប (c)

6. ក. កំណត់កូអរដោនេផ្ចិត និងកាំស្វី (S)

$$(S) : x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 4y + 4z = 0$$

$$x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 4y + 4z = 0$$

$$\Leftrightarrow (x^2 - 2x + 1) + (y^2 - 4y + 4)$$

$$+ (z^2 + 4z + 4) - 9 = 0$$

$$\Leftrightarrow (x - 1)^2 + (y - 2)^2 + (z + 2) = 3^2$$

$$\text{មានទំរង់ } (x - a)^2 + (y - b)^2 + (z - c)^2 = R^2$$

នាំអោយ $a = 1; b = 2; c = -2$ និង $R = 3$

ដូចនេះ

ផ្ចិត $I(1;2;-2)$ និងកាំ $R = 3$

ខ. បង្ហាញថាប្លង់ (P) កាត់ស្វ៊ែរ (S)

ប្លង់ (P) កាត់ស្វ៊ែរ (S) លុះត្រាតែចំងាយពីផ្ចិតស្វ៊ែរទៅប្លង់ (P)
តូចជាងកាំ R នៃស្វ៊ែរ (S)

គេមានកាំស្វ៊ែរ $R = 3$ និង ប្លង់ $(P): x + 2y + 2z + 5 = 0$

$$\text{ចំងាយ } d(I, (P)) = \frac{|1 + 2 \cdot 2 + 2(-2) + 5|}{\sqrt{1^2 + 2^2 + 2^2}} = \frac{6}{3} = 2$$

$$\text{ដោយ } d(I, (P)) = 2 < R = 3$$

ដូចនេះ

បង្ហាញថាប្លង់ (P) កាត់ស្វ៊ែរ (S)

គ. រកសមីការបណ្តាប្លង់ស្របនឹងប្លង់ (P) ហើយប៉ះស្វ៊ែរ (S)

ប្លង់ (P) មានវ៉ិចទ័រណរម៉ាល់ $\vec{n}(1;2;2)$

តាង $M(x_0; y_0; z_0)$ ជាចំណុចដែលប៉ះស្វ៊ែរ (S)

គេបាន $\vec{IM}(x_0 - 1; y_0 - 2; z + 2)$

ដោយ $\vec{n} \parallel \vec{IM}$ គេបាន:

$$\vec{n} \times \vec{IM} = 0$$

$$\begin{aligned} \text{គេមាន } \vec{n} \times \vec{IM} &= \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 2 & 2 \\ (x_0 - 1)(y_0 - 2)(z_0 + 2) \end{vmatrix} \\ &= [2(z_0 + 2) - 2(y_0 - 2)]\vec{i} - [(z_0 + 2) - 2(x_0 - 1)]\vec{j} \\ &\quad + [(y_0 - 2) - 2(x_0 - 1)]\vec{k} = (2z_0 - 2y_0 + 8)\vec{i} \\ &\quad - (z_0 - 2x_0 + 4)\vec{j} + (y_0 - 2x_0)\vec{k} \\ \text{គេបាន } \begin{cases} 2z_0 - 2y_0 + 8 = 0 & (1) \\ z_0 - 2x_0 + 4 = 0 & (2) \\ y_0 - 2x_0 = 0 & (3) \end{cases} \end{aligned}$$

តាម(3) $\Rightarrow y_0 = 2x_0$ យកទៅជំនួសក្នុង (1); (2)

$$\begin{aligned} &\begin{cases} 2z_0 - 4x_0 + 8 = 0 \\ z_0 - 2x_0 + 4 = 0 \end{cases} \times (-2) \\ &\hline &0 = 0 \end{aligned}$$

ប្រព័ន្ធសមីការមានឫសរាប់មិនអស់ តាង $x_0 = t; (t \in \mathbb{R})$

$$\text{តាម}(3) \Rightarrow y_0 = 2x_0 = 2t$$

$$(2) \Rightarrow z_0 = 2x_0 - 4 = 2t - 4$$

យក $x_0; y_0; z_0$ ជំនួសក្នុងសមីការស្វ័យ (S) គេបាន:

$$t^2 + 4t^2 + (2t - 4)^2 - 2t - 8t + 4(2t - 4) = 0$$

$$9t^2 - 16t - 10t + 8t + 16 - 16 = 0$$

$$9t^2 - 18t = 0$$

$$9t(t - 2) = 0$$

$$\Rightarrow \begin{cases} t = 0 \\ t - 2 = 0 \Rightarrow t = 2 \end{cases}$$

$$\text{ចំពោះ } t = 0 \Rightarrow M_1(0;0;-4)$$

$$t = 2 \Rightarrow M_2(2;4;0)$$

ប្លង់ $(Q_1); (Q_2)$ កាត់តាមចំណុចរៀងគ្នា $M_1(0;0;-4)$ និង $M_2(2;4;0)$ ហើយកែងនឹង $\vec{n}(1;2;2)$ កំណត់ដោយ:

$$\begin{cases} (Q_1): (x - 0) + 2(y - 0) + 2(z + 4) = 0 \\ (Q_2): (x - 2) + 2(y - 4) + 2(z - 0) = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} (Q_1): x + 2y + 2z + 8 = 0 \\ (Q_2): x + 2y + 2z - 10 = 0 \end{cases}$$

ដូចនេះ

$$(Q_1): x + 2y + 2z + 8 = 0; (Q_2): x + 2y + 2z - 10 = 0$$

វិញ្ញាសាទី៦

ប្រឡងជ្រើសរើសគ្រូបឋមសិក្សាបឋមភូមិ

សម័យប្រឡង: ១៦ តុលា ២០០៨

រយៈពេល: ២ ម៉ោង



1. ក. ដោះស្រាយសមីការ:

$$\frac{x-1}{1991} + \frac{x-5}{1987} + \frac{x+7}{1999} + \frac{x-11}{1981} = 4$$

ខ. ដោះស្រាយសមីការ: $\ln \sqrt{x^2} = \sqrt{2 \ln(-x)}$

គ. ដោះស្រាយវិសមីការ: $0 < \frac{x^2 - 2x - 3}{x - 2} < 4$

2. គេអោយអនុគមន៍ f កំណត់ដោយ $f(x) = \frac{5x^2 + 20x + 6}{x^3 + 2x^2 + x}$

ក. កំណត់តម្លៃ A, B, C ដើម្បីអោយ

$$f(x) = \frac{A}{x} + \frac{B}{x+1} + \frac{C}{(x+1)^2}$$

ខ. គណនា $F(x) = \int \frac{5x^2 + 20x + 6}{x^3 + 2x^2 + x} dx$

3. គេមានថង់ពីរ A និង B ។ ក្នុងថង់ A មានប៊ូលស1 និងប៊ូលខ្មៅ3 ។
ក្នុងថង់ B មានប៊ូលស5 និងប៊ូលខ្មៅ3 ។ គេទាញយកប៊ូលមួយពីថង់
និងប៊ូលមួយពីថង់ B រួចហើយប្តូរគ្នា ។

ក. រកប្រូបាបដើម្បីអោយថង់ A មានប៊ូលពណ៌ខ្មៅបន្ទាប់ពីប្តូរគ្នា

ខ. រកប្រូបាបដើម្បីអោយពណ៌ប៊ូលនៅក្នុងថង់នីមួយៗនៅដដែល
បន្ទាប់ពីប្តូរគ្នា ។

4. ក. ដោះស្រាយសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល $(E): y'' + 4y' + 4y = 0$

ខ. គេអោយសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល $(F): y'' + 4y' + 4y = -4$

កំណត់ចំនួនពិត a និង b ដែលអនុគមន៍ $\varphi : x \mapsto ax + b$ ជា
ចំលើយនៃ (F) ។

5. ក្នុងលំហប្រដាប់ដោយតំរុយអរតូណរម៉ាល់វិជ្ជមាន $(0; \vec{i}; \vec{j}; \vec{k})$ គេ
អោយបួនចំណុច $A(-2; 0; 1); B(0; 10; 3); C(2; 0; -1)$ និង
 $D(5; 3; -1)$ ។

ក. សរសេរសមីការប្លង់ (P) កាត់តាមចំណុច $A; B$ និង C ។

ខ. សរសេរសមីការបន្ទាត់កាត់តាមចំណុច D ហើយកែងនឹង (P) ។

គ. សរសេរសមីការស្វ៊ីផ្ចិត D ហើយប៉ះប្លង់ (P) ។

6. គេអោយអនុគមន៍ f កំណត់ដោយ $f(x) = 3 \sin x - 2 \sin^3 x$

ក. សិក្សាអថេរភាព និងសង់ខ្សែកោង (C) តាង f ។

ខ. រកចំនួនពិត a និង b ដើម្បីអោយអនុគមន៍ F កំណត់ដោយ

$F(x) = a \cos x + b \cos^3 x$ ជាព្រីមីទីវនៃ f . ។

ចំណើយ

1. ក. ដោះស្រាយសមីការ:

$$\frac{x-1}{1991} + \frac{x-5}{1987} + \frac{x+7}{1999} + \frac{x-11}{1981} = 4$$

$$\Leftrightarrow \frac{x-1992+1991}{1991} + \frac{x-1992+1987}{1987}$$

$$+ \frac{x-1992+1999}{1999} + \frac{x-1992+1981}{1981} = 4$$

$$\Leftrightarrow \frac{x-1992}{1991} + 1 + \frac{x-1992}{1987} + 1 + \frac{x-1992}{1999} + 1$$

$$+ \frac{x-1992}{1981} + 1 = 4$$

$$\Leftrightarrow (x-1992) \left(\frac{1}{1991} + \frac{1}{1987} + \frac{1}{1999} + \frac{1}{1981} \right)$$

$$+ 4 = 4$$

$$\Leftrightarrow (x-1992) \left(\frac{1}{1991} + \frac{1}{1987} + \frac{1}{1999} + \frac{1}{1981} \right) = 0$$

$$\Leftrightarrow x-1992=0 \Rightarrow x=1992$$

ដូចនេះ

$$x=1992$$

ខ. ដោះស្រាយសមីការ $\ln \sqrt{x^2} = \sqrt{2 \ln(-x)}$

សមីការមានន័យកាលណា $\begin{cases} x^2 > 0 \\ \ln(-x) \geq 0 \end{cases} \Rightarrow x < 0$

គេបាន:

$$\ln|x| = \sqrt{2 \ln(-x)}$$

$$\ln(-x) = \sqrt{2 \ln(-x)}$$

$$\ln^2(-x) = 2 \ln(-x)$$

$$\ln^2(-x) - 2 \ln(-x) = 0$$

$$\ln(-x)[\ln(-x) - 2] = 0$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \ln(-x) = 0 \Rightarrow x = -1 \\ \ln(-x) - 2 = 0 \end{cases}$$

$$\ln(-x) = 2$$

$$\Rightarrow -x = e^2 \text{ ឬ } x = -e^2$$

ដូចនេះ

$$x = -1; x = -e^2$$

គ. ដោះស្រាយវិសមីការ:

$$0 < \frac{x^2 - 2x - 3}{x - 2} < 4$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \frac{x^2 - 2x - 3}{x - 2} > 0 & (1) \\ \frac{x^2 - 2x - 3}{x - 2} < 4 \end{cases}$$

$$\frac{x^2 - 2x - 3}{x - 2} - 4 < 0$$

$$\frac{x^2 - 2x - 3 - 4(x - 2)}{x - 2} < 0$$

$$\frac{x^2 - 6x + 5}{x - 2} < 0 \quad (2)$$

$$\text{បើ } x^2 - 2x - 3 = 0$$

$$\Rightarrow x = -1; x = 3$$

$$\text{បើ } x^2 - 6x + 5 = 0$$

$$\Rightarrow x = 1; x = 5$$

បើ $x - 2 = 0 \Rightarrow x = 2$

តារាងសញ្ញា

x	$-\infty$	-1	1	2	3	5	$+\infty$
$x^2 - 2x - 3$	+	0	-	-	-	0	+
$x^2 - 6x + 5$	+	+	0	-	-	-	0
$x - 2$	-	-	-	0	+	+	+
(1)		-	0	+	+		-
(2)	-	-	0	+	-	-	0
$(1) \cap (2)$							

$\Rightarrow x \in]-1; 1[\cup]3; 5[$

ដូចនេះ

$x \in]-1; 1[\cup]3; 5[$ ជាចំណុចនៃវិសមីការ

2. គេអោយអនុគមន៍ $f(x) = \frac{5x^2 + 20x + 6}{x^3 + 2x^2 + x}$

ក. កំណត់តម្លៃ A, B, C

គេមាន $f(x) = \frac{A}{x} + \frac{B}{x+1} + \frac{C}{(x+1)^2}$

$$= \frac{A(x+1)^2 + Bx(x+1) + Cx}{x(x+1)^2}$$

$$= \frac{A(x^2 + 2x + 1) + B(x^2 + x) + Cx}{x(x^2 + 2x + 1)}$$

$$= \frac{(A+B)x^2 + (2A+B+C)x + A}{x^3 + 2x^2 + x}$$

តែ $f(x) = \frac{5x^2 + 20x + 6}{x^3 + 2x^2 + x}$

នាំអោយ $\begin{cases} A+B=5 \\ 2A+B+C=20 \\ A=6 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} A=6 \\ B=-1 \\ C=9 \end{cases}$

ដូចនេះ

$$A = 6; B = -1; C = 9$$

ខ, គណនា

$$F(x) = \int \frac{5x^2 + 20x + 6}{x^3 + 2x^2 + x} dx$$

$$= \int \left(\frac{6}{x} + \frac{-1}{x+1} + \frac{9}{(x+1)^2} \right) dx$$

$$= 6 \ln|x| - \ln|x+1| - \frac{9}{x+1} + c$$

ដូចនេះ

$$F(x) = 6 \ln|x| - \ln|x+1| - \frac{9}{x+1} + c$$

3. ក, រកប្រូបាបដើម្បីអោយថង់ A មានប៊ូលខ្មៅបន្ទាប់ពីប្តូរគ្នា
តាង E “ជាព្រឹត្តិការណ៍ដែលថង់ A មានប៊ូលខ្មៅបន្ទាប់ពីប្តូរគ្នា”
ក្នុងថង់ A មានប៊ូលសុទ្ធតែពណ៌ខ្មៅបន្ទាប់ពីប្តូរកាលណា គេចាប់
បានប៊ូលស1 ពីថង់ A និងប៊ូលខ្មៅ1 ពីថង់ B

គេបាន: $P(E) = P(\text{ស}) \times P(\text{ខ})$

$$= \frac{1}{4} \times \frac{3}{8} = \frac{3}{32}$$

ដូចនេះ

$$P(E) = \frac{3}{32}$$

ខ. រកប្រូបាបដើម្បីអោយពណ៌ប៊ូលនៅក្នុងថង់នីមួយៗនៅដដែល
បន្ទាប់ពីប្តូរគ្នា

បន្ទាប់ពីប្តូរគ្នាពណ៌ប៊ូលនៅក្នុងថង់នីមួយៗនៅដដែល មានន័យថា
គេចាប់បានប៊ូលពណ៌ដូចគ្នាពីក្នុងថង់នីមួយៗ ។

តាង F “ជាព្រឹត្តិការណ៍ពណ៌ប៊ូលនៅដដែលបន្ទាប់ពីប្តូរគ្នា”

គេបាន:

$$P(F) = (P(\text{ស})_A \times P(\text{ស})_B) + (P(\text{ខ})_A \times P(\text{ខ})_B)$$

$$= \left(\frac{1}{4} \times \frac{5}{8}\right) + \left(\frac{3}{4} \times \frac{3}{8}\right) = \frac{5}{32} + \frac{9}{32} = \frac{14}{32} = \frac{7}{16}$$

ដូចនេះ

$$P(F) = \frac{7}{16}$$

4. ក. ដោះស្រាយសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល

$$(E): y'' + 4y' + 4y = 0$$

មានសមីការសំគាល់ $r^2 + 4r + 4 = 0$

$$\Delta' = 4 - 4 = 0$$

$$\Rightarrow r_0 = r_1 = r_2 = -2$$

គេបាន $y = (Ax + B)e^{-2x}; (A, B \in R)$

ដូចនេះ $y = (Ax + b)e^{-2x}$ ជាចំណេះដឹងទូទៅនៃសមីការ (E)

ខ. កំណត់ចំនួនពិត a និង b

គេមាន: (F): $y'' + 4y' + 4y = -4x$

$$\varphi(x) = ax + b$$

$$\Rightarrow \varphi'(x) = a$$

$$\Rightarrow \varphi''(x) = 0$$

ដោយ φ ជាចំណេះដឹងនៃ (F) នោះគេបាន:

$$\varphi''(x) + 4\varphi'(x) + 4\varphi(x) = -4x$$

$$0 + 4a + 4(ax + b) = -4x$$

$$4ax + 4a + 4b = -4x$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 4a = -4 \\ 4a + 4b = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -1 \\ b = 1 \end{cases}$$

ដូចនេះ $a = -1; b = 1$

5. ក. សរសេរសមីការប្លង់(P) កាត់តាមចំណុច $A; B; C$

គេមាន $A(-2;0;1); B(0;10;3); C(2;0;-1)$ និង $D(5;3;-1)$

គេបាន $\vec{AB}(2;10;2); \vec{AC}(4;0;-2)$

$$\Rightarrow \vec{AB} \times \vec{AC} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 2 & 10 & 2 \\ 4 & 0 & -2 \end{vmatrix} = -20\vec{i} + 12\vec{j} - 40\vec{k}$$

ប្លង់ (P) កាត់តាម $A(-2;0;1)$ ហើយកែងនឹងវ៉ិចទ័រ

$\vec{AB} \times \vec{AC}(-20;12;-40)$ កំណត់ដោយ:

$$(P): -20(x+2) + 12(y-0) - 40(z-1) = 0$$

$$(P): -20x + 12y - 40z - 40 + 40 = 0$$

$$(P): -20x + 12y - 40z = 0$$

$$(P): 5x - 3y + 10z = 0$$

ដូចនេះ $(P): 5x - 3y + 10z = 0$

ខ. សរសេរសមីការបន្ទាត់ដែលកាត់តាម D ហើយកែងនឹងប្លង់(P)

បន្ទាត់ (d) កាត់តាម $D(5;3;-1)$ ហើយស្របនឹងវ៉ិចទ័រ

$\vec{AB} \times \vec{AC}(-20;12;-40)$ កំណត់ដោយ:

$$(d): \begin{cases} x = x_0 + at \\ y = y_0 + bt \\ z = z_0 + ct; (t \in R) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 5 - 20t \\ y = 3 + 12t \\ z = -1 - 40t \end{cases}$$

ដូចនេះ

$$(d): x = 5 - 20t; y = 3 + 12t; z = -1 - 40t$$

គ. សរសេរសមីការស្វ័យផ្ចិត D ហើយប៉ះបង្គំ (P)

ដោយស្វ័យ (S) មានចំណុច $D(5;3;-1)$ ជាផ្ចិតហើយប៉ះបង្គំ (P)

នោះចំងាយពី D ទៅបង្គំ (P) ជាកាំនៃស្វ័យ

$$\begin{aligned} R = d(D, (P)) &= \frac{|5x_0 - 3y_0 + 10z_0|}{\sqrt{5^2 + (-3)^2 + 10^2}} \\ &= \frac{|25 - 9 - 10|}{\sqrt{25 + 9 + 100}} \\ &= \frac{6}{\sqrt{134}} \end{aligned}$$

$$\text{គេបាន } (S): (x-5)^2 + (y-3)^2 + (z+1)^2 = \left(\frac{6}{\sqrt{134}}\right)^2$$

$$x^2 - 10x + 25 + y^2 - 6y + 9 + z^2 + 2z + 1 = \frac{36}{134}$$

$$x^2 + y^2 + z^2 - 10x - 6y + 2z + 35 = \frac{18}{67}$$

$$x^2 + y^2 + z^2 - 10x - 6y + 2z + \frac{2327}{67} = 0$$

ដូចនេះ

$$x^2 + y^2 + z^2 - 10x - 6y + 2z + \frac{2327}{67} = 0$$

6. គេអោយអនុគមន៍ $f(x) = 3\sin x - 2\sin^3 x$

ក. សិក្សាអថេរភាព និងសង់ខ្សែកោង (c) តាង f

តាង $t = \sin x$; $(-1 \leq t \leq 1)$

គេបាន: $f(t) = 3t - 2t^3$

ដែនកំណត់ $D = [-1; 1]$

ទិសដៅអថេរភាព

$$f'(t) = 3 - 6t^2$$

$$\text{បើ } f'(t) = 0 ; 3 - 6t^2 = 0$$

$$-6t^2 = -3$$

$$t^2 = \frac{3}{6} \Rightarrow t = \pm \sqrt{\frac{1}{2}} = \pm \frac{\sqrt{2}}{2}$$

សញ្ញានៃ $f(t)$

t	-1	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	1	
$f'(t)$	$-$	0	$+$	0	$-$

$$\text{តំលៃបរមា: } f\left(\frac{-\sqrt{2}}{2}\right) = 3\left(\frac{-\sqrt{2}}{2}\right) - 2\left(\frac{-\sqrt{2}}{2}\right)^3$$

$$= \frac{-3\sqrt{2}}{2} + \frac{4\sqrt{2}}{8}$$

$$= \frac{-3\sqrt{2} + \sqrt{2}}{2} = -\sqrt{2}$$

$$f\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = 3\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right) - 2\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^3$$

$$= \frac{3\sqrt{2}}{2} - \frac{4\sqrt{2}}{8}$$

$$= \frac{3\sqrt{2} - \sqrt{2}}{2} = \sqrt{2}$$

តារាងអថេរភាពនៃ f

t	-1	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	1	
$f'(t)$	-	0	+	0	-
$f(t)$	-1		$\sqrt{2}$		1


Diagram illustrating the function $f(t)$ and its derivative $f'(t)$ over the interval $t \in [-1, 1]$.

The derivative $f'(t)$ is zero at $t = -\frac{\sqrt{2}}{2}$ and $t = \frac{\sqrt{2}}{2}$. The function $f(t)$ has local extrema at these points: a local minimum at $t = -\frac{\sqrt{2}}{2}$ and a local maximum at $t = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

សង់ខ្សែកោង (c)

$$\sqrt{2} = 1,4$$

$$\frac{\sqrt{2}}{2} = 0,7$$



ខ. កំណត់តំលៃ a និង b

$$F(x) = a \cos x + b \cos^3 x$$

$$F'(x) = -a \sin x - 3b \sin x \cos^2 x$$

$$= -a \sin x - 3b \sin x (1 - \sin^2 x)$$

$$= (-a - 3b) \sin x + 3b \sin^3 x$$

ដោយ $F(x)$ ជាព្រីមីទីវនៃ $f(x)$ គេបាន:

$$F'(x) = f(x)$$

$$\Leftrightarrow (-a - 3b) \sin x + 3b \sin^3 x = 3 \sin x - 2 \sin^3 x$$

$$\Rightarrow \begin{cases} -a - 3b = 3 \\ 3b = -2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -1 \\ b = \frac{-2}{3} \end{cases}$$

ដូចនេះ

$$a = -1; b = \frac{-2}{3}$$

វិញ្ញាសាទី៧

ប្រឡងជ្រើសរើសគ្រូបឋមសិក្សា និងមធ្យមសិក្សា
សម័យប្រឡង: ១៤ វិច្ឆិកា ២០០២

រយៈពេល: ២ ម៉ោង



1. ក. គណនាលីមីតអនុគមន៍ $f(x) = \frac{\sin 2x - \sin x}{\sin 2x + \sin x}$ ✓

កាលណា x ខិតជិតសូន្យ ។

ខ. គណនាផ្នែកពិត និង ផ្នែកនិមិត្តនៃចំនួនកុំផ្លិច $Z = \frac{1+i}{(1+i\sqrt{3})}$

2. សិក្សាភាពជាប់ និងភាពមានដេរីវេអនុគមន៍:

$$f(x) = (x-1)|x^2 - x| \text{ ត្រង់ចំណុច } x = 0 \text{ ។}$$

3. f ជាអនុគមន៍កំណត់លើ R ដែល $f(x) = |(x-1)(x-2)|$ ។

$$\text{គណនា } J = \int_0^2 f(x) dx \text{ ។}$$

4. ក្នុងតំរុយអរតូណរម៉ាល់ $(0; \vec{i}; \vec{j}; \vec{k})$ គេមានចំណុច $A(1;1;1)$

$B(2;3;4); C(6;5;2)$ និង $D(7;7;5)$ ។

១. បង្ហាញថា $A; B; C; D$ ជាកំពូលនៃប្រលេឡូក្រាម

ខ. គណនាផ្ទៃក្រឡាប្រលេឡូក្រាមនេះ ។

5. គេអោយអនុគមន៍ $f(x) = 2 + \frac{1}{x+1} - \frac{1}{(x+1)^2}$ ដែល

កំណត់ក្នុង $R - \{-1\}$ ។

ក. គណនាដេរីវេ $f'(x)$ នៃអនុគមន៍ $f(x)$ និងសិក្សាសញ្ញាវ៉ា

ខ. រកបួសសមីការ $f(x) = 0$

គ. សិក្សាអថេរភាព និង គូសខ្សែកោង(c) តាងអនុគមន៍ $f(x)$

ក្នុងតំរុយអរតូណរមេ រួចរកកូអរដោនេចំណុចរបត់

ឃ. សរសេរសមីការនៃបន្ទាត់ប៉ះទៅនឹងខ្សែកោង(c) ត្រង់ចំណុច

ដែលមានអាប់ស៊ីសស្មើសូន្យ ។

ចំណើយ

1. ក. គណនាលីមីត

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x - \sin x}{\sin 2x + \sin x} \quad \text{រាង } \frac{0}{0} \\&= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \sin x \cos x - \sin x}{2 \sin x \cos x + \sin x} \\&= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x(2 \cos x - 1)}{\sin x(2 \cos x + 1)} \\&= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \cos x - 1}{2 \cos x + 1} = \frac{2 - 1}{2 + 1} = \frac{1}{3}\end{aligned}$$

ដូចនេះ

$$\boxed{\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \frac{1}{3}}$$

ខ. គណនាផ្នែកពិត និងផ្នែកនិមិត្តនៃ Z

$$\begin{aligned}Z &= \frac{1+i}{(1+i\sqrt{3})^4} = \frac{1+i}{(1+2i\sqrt{3}-3)^2} \\&= \frac{1+i}{4(i\sqrt{3}-1)^2} = \frac{1+i}{4(-3-2i\sqrt{3}+1)}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{1+i}{4(-2-2i\sqrt{3})} = \frac{1+i}{8(-1-i\sqrt{3})} \\
 &= \frac{(1+i)(-1+i\sqrt{3})}{8(1+3)} = \frac{-1-\sqrt{3}-i+i\sqrt{3}}{8 \times 4} \\
 &= \frac{-1-\sqrt{3}}{32} + \frac{-1+\sqrt{3}}{32}i
 \end{aligned}$$

ដូចនេះ

ផ្នែកពិតគឺ $\frac{-1-\sqrt{3}}{32}$ និងផ្នែកនិមិត្តគឺ $\frac{-1+\sqrt{3}}{32}$
--

2. សិក្សាភាពជាប់ និងភាពមានដេរីវេនៃអនុគមន៍ $f(x)$

សិក្សាភាពជាប់នៃអនុគមន៍ត្រង់ $x=0$

$$f(x) = (x-1)|x^2 - x|$$

$$f(0) = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} (x-1)|x^2 - x| = (-1) \times |0| = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} (x-1)|x^2 - x| = (-1) \times |0| = 0$$

$$\text{ដោយ } \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = f(0) = 0$$

$\Rightarrow f$ ជាអនុគមន៍ជាប់ត្រង់ $x = 0$

ដូចនេះ

អនុគមន៍ f ជាអនុគមន៍ជាប់ត្រង់ $x = 0$

សិក្សាភាពដេរីវេនៃអនុគមន៍ត្រង់ $x = 0$

$$f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

$$\text{គេបាន } f'(0^-) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{(x-1)|x^2 - x|}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{(x-1)|x||x-1|}{x}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{-x(x-1)|x-1|}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} [-(x-1)|x-1|] = 1$$

$$f'(0^+) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{(x-1)|x^2 - x|}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{|x|(x-1)|x-1|}{x}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0^+} [(x-1)|x-1|] = -1$$

$$\text{ដោយ } f'(0^-) = 1 \neq f'(0^+) = -1$$

$$\Rightarrow f \text{ គ្មានដេរីវេត្រង់ } x=0$$

ដូចនេះ

អនុគមន៍ f គ្មានដេរីវេត្រង់ $x=0$

$$3. \text{ គណនា } J = \int_0^2 f(x) dx$$

$$\text{គេមាន } f(x) = |(x-1)(x-2)| = |x^2 - 3x + 2|$$

x	$-\infty$	1	2	$+\infty$
$x^2 - 3x + 2$	+	-	+	
$ x^2 - 3x + 2 $	$x^2 - 3x + 2$	$-(x^2 - 3x + 2)$	$x^2 - 3x + 2$	

$$\text{គេបាន } J = \int_0^2 f(x) dx = \int_0^2 |(x-1)(x-2)| dx$$

$$= \int_1^2 -(x^2 - 3x + 2) dx + \int_0^1 (x^2 - 3x + 2) dx$$

$$\begin{aligned}
&= -\left(\frac{x^3}{3} - \frac{3}{2}x^2 + 2x\right)\Big|_1^2 + \left(\frac{x^3}{3} - \frac{3}{2}x^2 + 2x\right)\Big|_0^1 \\
&= -\left(\frac{8}{3} - 6 + 4\right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{3}{2} + 2\right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{3}{2} + 2\right) - 0 \\
&= -\frac{8}{3} + 2 + 2\left(\frac{1}{3} - \frac{3}{2} + 2\right) = -\frac{8}{3} + \frac{2}{3} - 3 + 4 + 2 \\
&= -2 - 3 + 6 = 1
\end{aligned}$$

ដូចនេះ $J = 1$

4. ក. បង្ហាញថាចំណុច $A; B; C; D$ ជាកំពូលនៃប្រលេឡូក្រាម

គេមាន $A(1;1;1); B(2;3;4); C(6;5;2)$ និង $D(7;7;5)$

គេបាន $\overrightarrow{AC}(5;4;1); \overrightarrow{BD}(5;4;1); \overrightarrow{AB}(1;2;3); \overrightarrow{CD}(1;2;3)$

$$\left. \begin{array}{l} \overrightarrow{AC}(5;4;1) \\ \overrightarrow{BD}(5;4;1) \end{array} \right| \Rightarrow \overrightarrow{AC} \parallel \overrightarrow{BD} \quad (1)$$

$$\left. \begin{array}{l} \vec{AB}(1;2;3) \\ \vec{CD}(1;2;3) \end{array} \right| \Rightarrow \vec{AB} \parallel \vec{CD} \quad (2)$$

តាម (1) និង (2) បង្ហាញថា $ABCD$ ជាប្រលេឡូក្រាម
ដែលមានកំពូល $A; B; C; D$

ដូចនេះ

បង្ហាញថា $A; B; C; D$ ជាកំពូលនៃប្រលេឡូក្រាម

ខ. គណនាក្រឡាផ្ទៃប្រលេឡូក្រាម

$$\vec{AB} \times \vec{AC} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 2 & 3 \\ 5 & 4 & 1 \end{vmatrix} = -10\vec{i} + 14\vec{j} - 6\vec{k}$$

$$S_{ABCD} = \left\| \vec{AB} \times \vec{AC} \right\| = \sqrt{(-10)^2 + 14^2 + (-6)^2}$$

$$= \sqrt{100 + 196 + 36} = \sqrt{332} = 2\sqrt{83}$$

ដូចនេះ

$$S_{ABCD} = 2\sqrt{83} \text{ (ឯកតាផ្ទៃ)}$$

5. គេឱ្យអនុគមន៍ $f(x) = 2 + \frac{1}{x+1} - \frac{1}{(x+1)^2}$ ដែលមាន

ដែនកំណត់ $D_f = R - \{-1\}$ ។

ក. គណនាដេរីវេ $f'(x)$ និងសិក្សាសញ្ញារបស់វា

$$\begin{aligned}\forall x \in D_f \Rightarrow f'(x) &= \frac{-1}{(x+1)^2} + \frac{2}{(x+1)^3} \\ &= \frac{-(x+1) + 2}{(x+1)^3} \\ &= \frac{-x-1+2}{(x+1)^3} \\ &= \frac{-x+1}{(x+1)^3}\end{aligned}$$

ដូចនេះ

$$f'(x) = \frac{-x+1}{(x+1)^3}$$

$$\text{បើ } f'(x) = 0 \quad ; \quad \frac{-x+1}{(x+1)^3} = 0$$

$$-x+1=0 \Rightarrow x=1$$

ដូចនេះ សមីការបន្ទាត់ប៉ះ

$$(T_1): y = -x - 2\sqrt{3} - 1$$

$$(T_2): y = -x + 2\sqrt{3} - 1$$

5. ក. គណនាផលគុណវ៉ិចទ័រ $\vec{AB} \times \vec{AC}$ រួចទាញបញ្ជាក់ថា
ចំណុច $A; B; C$ រត់មិនត្រង់គ្នា

$$\vec{AB}(1;1;2); \vec{AC}(0;2;-1)$$

$$\text{គេបាន } \vec{AB} \times \vec{AC} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & -1 \end{vmatrix} = -5\vec{i} + \vec{j} + 2\vec{k}$$

ដូចនេះ

$$\vec{AB} \times \vec{AC} = -5\vec{i} + \vec{j} + 2\vec{k}$$

ដោយ $\vec{AB} \times \vec{AC} \neq 0$ នោះចំណុច $A; B; C$ រត់មិនត្រង់គ្នា

ដូចនេះ

បញ្ជាក់ថាចំណុច $A; B$ និង C រត់មិនត្រង់គ្នា

ខ. រកក្រឡាផ្ទៃត្រីកោណ ABC

$$S_{ABC} = \frac{1}{2} \left\| \vec{AB} \times \vec{AC} \right\|$$

$$\text{ដោយ } \left\| \vec{AB} \times \vec{AC} \right\| = \sqrt{(-5)^2 + 1^2 + 2^2} = \sqrt{30}$$

ដូចនេះ

$$S_{ABC} = \frac{\sqrt{30}}{2} \text{ (ឯកតាផ្ទៃ)}$$

គ. សរសេរសមីការប្លង់

ប្លង់ (ABC) កាត់តាមចំណុច $B(0;2;4)$ ហើយមាន

វ៉ិចទ័រណរម៉ាល់ $\vec{AB} \times \vec{AC}(-5;1;2)$ កំណត់ដោយ:

$$(ABC): -5(x-0) + (y-2) + 2(z-4) = 0$$

$$(ABC): -5x + y + 2z - 2 - 8 = 0$$

$$(ABC): -5x + y + 2z - 10$$

$$(ABC): 5x - y - 2z + 10 = 0$$

ដូចនេះ

$$(ABC): 5x - y - 2z + 10 = 0$$

វិញ្ញាសាទី៩

ប្រឡងជ្រើសរើសគ្រូបឋមសិក្សា និងមត្តេយ្យសិក្សា

សម័យប្រឡង: ១៣ វិច្ឆិកា ២០០៤

រយៈពេល: ២ ម៉ោង



1. ចូរដោះស្រាយវិសមីការ:

ក, $\sin x + \sqrt{3} \cos x \geq 1$ បើ $-\pi \leq x \leq \pi$

ខ, $\log_2(2-x) + \log_4(x+3) \leq 1$

2. ក, កំណត់ចំនួនថេរ a និង b ដើម្បីអោយចំពោះគ្រប់ x គេបាន

$$\frac{1}{x(x+1)(x+2)} = \frac{a}{x(x+1)} + \frac{b}{(x+1)(x+2)}$$

ខ, គណនាផលបូក

$$S = \frac{1}{1 \cdot 2 \cdot 3} + \frac{1}{2 \cdot 3 \cdot 4} + \dots + \frac{1}{n(n+1)(n+2)}$$

រួចរកលីមីត S កាលណា n ខិតជិត $+\infty$ ។

3. គេបង្កើតគណៈកម្មការមួយមានសមាជិក 5 នាក់ ក្នុងចំណោម

មនុស្ស 12 នាក់ ។ ចំពោះមនុស្សទាំងនេះ មានពីរនាក់ A និង B អាចចូលជាសមាជិកបាន លុះត្រាតែចូលទាំងពីរនាក់ ។

ក. តើគេអាចបង្កើតគណៈកម្មការបានប៉ុន្មានរបៀប ?

ខ. រកប្រូបាបដើម្បីអោយ A និង B បានចូលជាសមាជិកគណៈកម្មការទាំងពីរនាក់ ។

4. ក្នុងតំរុយអរតូណរម៉ាល់នៃលំហ គេអោយប្លង់(P) និងស្វ៊ែរ (S) មានសមីការ (P): $x + 2y + 2z + 5 = 0$ និង សមីការស្វ៊ែរ

$$(S): x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 4y + 4z = 0$$

ក. កំណត់កូអរដោនេ ផ្ចិត I និងកាំ R នៃស្វ៊ែរ(S)

ខ. បង្ហាញថាប្លង់ (P) កាត់ស្វ៊ែរ(S) រួចរកសមីការប្លង់ស្របនឹងប្លង់ (P) ហើយប៉ះនឹងស្វ៊ែរ(S) ។

5. គេឱ្យអនុគមន៍ $y = f(x) = \frac{x^2 - 2x + 1}{-2x - 4}$

ក. សិក្សាអថេរភាព និងសង់ខ្សែកោង (C) តាងអនុគមន៍ រួចស្រាយបញ្ជាក់ថា ខ្សែកោងនេះមានផ្ចិតបំលែងឆ្លុះមួយ

- ខ. កំណត់សមីការបន្ទាត់ប៉ះនឹងខ្សែកោង (c) ដោយដឹងថា បន្ទាត់ប៉ះនេះកាត់តាមចំណុច $A(0;2)$
- គ. គណនាផ្ទៃក្រឡា S ផ្ទៃក្នុងខណ្ឌដោយខ្សែកោង (c)
- អាស៊ីមតូតទ្រេត បន្ទាត់ $x = 3$ និងបន្ទាត់ $x = 4$ ។

ចំណើយ

1. ដោះស្រាយវិសមីការ:

ក. $\sin x + \sqrt{3} \cos x \geq 1$ បើ $-\pi \leq x \leq \pi$

$$2 \left(\frac{1}{2} \sin x + \frac{\sqrt{3}}{2} \cos x \right) \geq 1$$

$$2 \left(\sin \frac{\pi}{6} \sin x + \cos \frac{\pi}{6} \cos x \right) \geq 1$$

$$2 \cos \left(x - \frac{\pi}{6} \right) \geq 1$$

$$\cos \left(x - \frac{\pi}{6} \right) \geq \frac{1}{2}$$

$$\cos\left(x - \frac{\pi}{6}\right) \geq \cos \frac{\pi}{3}$$

$$-\frac{\pi}{3} + 2k\pi \leq x - \frac{\pi}{6} \leq \frac{\pi}{3} + 2k\pi; (k \in \mathbb{Z})$$

$$\frac{\pi}{6} - \frac{\pi}{3} + 2k\pi \leq x \leq \frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{3} + 2k\pi$$

$$-\frac{\pi}{6} + 2k\pi \leq x \leq \frac{\pi}{2} + 2k\pi$$

ដូចនេះ

$$-\frac{\pi}{6} + 2k\pi \leq x \leq \frac{\pi}{2} + 2k\pi; (k \in \mathbb{Z})$$

$$2. \log_2(2-x) + \log_4(x+3) \leq 1$$

$$\text{វិសមីការមានន័យកាលណា} \begin{cases} 2-x > 0 \\ x+3 > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x < 2 \\ x > -3 \end{cases}$$

$$\text{រឺ } -3 < x < 2$$

$$\log_2(2-x) + \log_4(x+3) \leq 1$$

$$\frac{2}{2} \log_2(2-x) + \log_4(x+3) \leq 1$$

$$2 \log_4(2-x) + \log_4(x+3) \leq 1$$

$$\log_4(2-x)^2 + \log_4(x+3) \leq 1$$

$$\log_4(2-x)^2(x+3) \leq \log_4 4$$

$$(2-x)^2(x+3) \leq 4$$

$$(x+3)(4-4x+x^2) \leq 4$$

$$4x - 4x^2 + x^3 + 12 - 12x + 3x^2 \leq 4$$

$$x^3 - x^2 - 8x + 8 \leq 0$$

$$x^2(x-1) - 8(x-1) \leq 0$$

$$(x-1)(x^2-8) \leq 0 \quad (i)$$

x	$-\infty$	$-\sqrt{8}$	1	$\sqrt{8}$	$+\infty$
$(x-1)$	-	-	0	+	+
x^2-8	+	0	-	0	+
(i)	-	0	+	0	+

$$\Rightarrow x \in]-\infty; -\sqrt{8}] \cup [1; \sqrt{8}] \Rightarrow x \in]-3; -\sqrt{8}] \cup [1; 2[$$

តែ $-3 < x < 2$

ដូចនេះ

$$x =]-3; -\sqrt{8}] \cup [1; 2[\text{ ជាចំណើយនៃវិសមីការ}$$

2. ក. កំណត់ចំនួនថេរ a និង b

$$\begin{aligned} \text{តើមាន: } \frac{1}{x(x+1)(x+2)} &= \frac{a}{x(x+1)} + \frac{b}{(x+1)(x+2)} \\ &= \frac{a(x+2) + bx}{x(x+1)(x+2)} = \frac{ax + 2a + bx}{x(x+1)(x+2)} \\ &= \frac{(a+b)x + 2a}{x(x+1)(x+2)} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} a+b=0 \\ 2a=1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a=\frac{1}{2} \\ b=-\frac{1}{2} \end{cases}$$

ដូចនេះ

$$a = \frac{1}{2}; b = -\frac{1}{2}$$

ខ. គណនាផលបូក

$$S = \frac{1}{1 \cdot 2 \cdot 3} + \frac{1}{2 \cdot 3 \cdot 4} + \dots + \frac{1}{n(n+1)(n+2)}$$

តាមសំនួរ (ក) គេបាន:

$$+ \left\{ \begin{array}{l} \frac{1}{1 \cdot 2 \cdot 3} = \frac{1}{2 \cdot 1 \cdot 2} - \frac{1}{2 \cdot 2 \cdot 3} \\ \frac{1}{2 \cdot 3 \cdot 4} = \frac{1}{2 \cdot 2 \cdot 3} - \frac{1}{2 \cdot 3 \cdot 4} \\ \frac{1}{3 \cdot 4 \cdot 5} = \frac{1}{2 \cdot 3 \cdot 4} - \frac{1}{2 \cdot 4 \cdot 5} \\ \dots \dots \dots \\ \frac{1}{n(n+1)(n+2)} = \frac{1}{2n(n+1)} - \frac{1}{2(n+1)(n+2)} \end{array} \right.$$

គេបាន:

$$S = \frac{1}{2 \cdot 2} - \frac{1}{2(n+1)(n+2)} = \frac{1}{4} - \frac{1}{2(n+1)(n+2)}$$

ដូចនេះ ផលបូកនៃស្វ៊ីតគឺ

$$S = \frac{1}{4} - \frac{1}{2(n+1)(n+2)}$$

គណនាលីមីត $\lim_{x \rightarrow +\infty} S$

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow +\infty} S &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\frac{1}{4} - \frac{1}{2(n+1)(n+2)} \right] \\ &= \frac{1}{4} - 0 = \frac{1}{4}\end{aligned}$$

ដូចនេះ

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} S = \frac{1}{4}$$

3. ក. រកចំនួនរបៀបដែលគេអាចបង្កើតគណៈកម្មការ

$$\begin{aligned}n(S) &= C(12;5) = \frac{12!}{(12-5)!5!} \\ &= \frac{7! \times 8 \times 9 \times 10 \times 11 \times 12}{7!5!} = \frac{8 \times 9 \times 10 \times 11 \times 12}{2 \times 3 \times 4 \times 5} \\ &= 3 \times 2 \times 11 \times 12 = 792\end{aligned}$$

ដូចនេះ

គេអាចបង្កើតគណៈកម្មការបានចំនួន 792 របៀប

ខ. រកប្រូបាបដើម្បីអោយ A និង B បានចូលជាសមាជិកទាំងពីរនាក់
 តាង E ជាព្រឹត្តិការណ៍ដែល A និង B បានចូលជាសមាជិកទាំងពីរ
 គេបានចំនួនករណីសរុប $n(E) = C(2;2) \times C(10;3)$

$$n(E) = 1 \times \frac{10!}{7!3!} = \frac{8 \times 9 \times 10}{2 \times 3} = 4 \times 3 \times 10 = 120$$

$$\Rightarrow P(E) = \frac{n(E)}{n(S)} = \frac{120}{792} = 0,15$$

ដូចនេះ

$$P(E) = 0,15$$

4. ក. កំណត់កូអរដោនេផ្ចិត I និង កាំ R នៃស្វ៊ី (S)

$$(S): x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 4y + 4z = 0$$

$$x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 4y + 4z = 0$$

$$\Leftrightarrow (x^2 - 2x + 1) + (y^2 - 4y + 4)$$

$$+ (z^2 + 4z + 4) - 9 = 0$$

$$\Leftrightarrow (x-1)^2 + (y-2)^2 + (z+2)^2 = 3^2$$

$$\text{មានទំរង់ } (x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2 = R^2$$

នាំអោយ $a=1; b=2; c=-2$ និង $R=3$

ដូចនេះ ផ្ចិត $I(1;2;-2)$ និងកាំ $R=3$

ខ. បង្ហាញថាប្លង់ (P) កាត់ស្វ៊ែរ (S)

ប្លង់ (P) កាត់ស្វ៊ែរ (S) លុះត្រាតែចំងាយពីផ្ចិតស្វ៊ែរទៅប្លង់ (P) តូចជាងកាំ R នៃស្វ៊ែរ (S)

គេមានកាំស្វ៊ែរ $R=3$ និង ប្លង់ $(P): x+2y+2z+5=0$

$$\text{ចំងាយ } d(I, (P)) = \frac{|1+2 \cdot 2+2(-2)+5|}{\sqrt{1^2+2^2+2^2}} = \frac{6}{3} = 2$$

$$\text{ដោយ } d(I, (P)) = 2 < R = 3$$

ដូចនេះ បង្ហាញថាប្លង់ (P) កាត់ស្វ៊ែរ (S)

រកសមីការបណ្តាប្លង់ស្របនឹងប្លង់ (P) ហើយប៉ះស្វ៊ែរ (S)

ប្លង់ (P) មានវ៉ិចទ័រណរម៉ាល់ $\vec{n}(1;2;2)$

តាង $M(x_0; y_0; z_0)$ ជាចំណុចដែលប៉ះស្វ៊ែរ (S)

គេបាន $\vec{IM}(x_0 - 1; y_0 - 2; z_0 + 2)$

ដោយ $\vec{n} \parallel \vec{IM}$ គេបាន:

$$\vec{n} \times \vec{IM} = 0$$

$$\begin{aligned} \text{គេមាន } \vec{n} \times \vec{IM} &= \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 2 & 2 \\ (x_0 - 1) & (y_0 - 2) & (z_0 + 2) \end{vmatrix} \\ &= [2(z_0 + 2) - 2(y_0 - 2)]\vec{i} - [(z_0 + 2) - 2(x_0 - 1)]\vec{j} \\ &\quad + [(y_0 - 2) - 2(x_0 - 1)]\vec{k} = (2z_0 - 2y_0 + 8)\vec{i} \\ &\quad - (z_0 - 2x_0 + 4)\vec{j} + (y_0 - 2x_0)\vec{k} \end{aligned}$$

$$\begin{cases} 2z_0 - 2y_0 + 8 = 0 & (1) \\ z_0 - 2x_0 + 4 = 0 & (2) \\ y_0 - 2x_0 = 0 & (3) \end{cases}$$

តាម(3) $\Rightarrow y_0 = 2x_0$ យកទៅជំនួសក្នុង (1);(2)

$$\begin{aligned} &\begin{cases} 2z_0 - 4x_0 + 8 = 0 \\ z_0 - 2x_0 + 4 = 0 \end{cases} \times (-2) \\ &\hline &0 = 0 \end{aligned}$$

ប្រព័ន្ធសមីការមានឫសរាប់មិនអស់ តាង $x_0 = t; (t \in R)$

$$\text{តាម(3)} \Rightarrow y_0 = 2x_0 = 2t$$

$$(2) \Rightarrow z_0 = 2x_0 - 4 = 2t - 4$$

យក $x_0; y_0; z_0$ ជំនួសក្នុងសមីការផ្ទៃ(S) គេបាន:

$$t^2 + 4t^2 + (2t - 4)^2 - 2t - 8t + 4(2t - 4) = 0$$

$$9t^2 - 16t - 10t + 8t + 16 - 16 = 0$$

$$9t^2 - 18t = 0$$

$$9t(t - 2) = 0$$

$$\Rightarrow \begin{cases} t = 0 \\ t - 2 = 0 \Rightarrow t = 2 \end{cases}$$

$$\text{ចំពោះ } t = 0 \Rightarrow M_1(0;0;-4)$$

$$t = 2 \Rightarrow M_2(2;4;0)$$

ចូរ $(Q_1); (Q_2)$ កាត់តាមចំណុចរៀងគ្នា $M_1(0;0;-4)$ និង

$M_2(2;4;0)$ ហើយកែងនឹង $\vec{n}(1;2;2)$ កំណត់ដោយ:

$$\begin{cases} (Q_1): (x - 0) + 2(y - 0) + 2(z + 4) = 0 \\ (Q_2): (x - 2) + 2(y - 4) + 2(z - 0) = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} (Q_1): x + 2y + 2z + 8 = 0 \\ (Q_2): x + 2y + 2z - 10 = 0 \end{cases}$$

ដូចនេះ

$$(Q_1): x + 2y + 2z + 8 = 0; (Q_2): x + 2y + 2z - 10 = 0$$

5. គេអោយអនុគមន៍ $y = f(x) = \frac{x^2 - 2x + 1}{-2x - 4}$

ក. សិក្សាអថេរភាព និងសង់ខ្សែកោង(c)តាមអនុគមន៍

ដែនកំណត់ $D_f = R - \{-2\}$

ទិសដៅអថេរភាព

$$f'(x) = \frac{(2x - 2)(-2x - 4) + 2(x^2 - 2x + 1)}{(-2x - 4)^2}$$

$$= \frac{-2(x - 1)2(x + 2) + 2(x - 1)^2}{(-2x - 4)^2}$$

$$= \frac{(x - 1)[-4(x + 2) + 2(x - 1)]}{4(x + 2)^2}$$

$$= \frac{(x-1)(-4x-8+2x-2)}{4(x+2)^2}$$

$$= \frac{(x-1)(-2x-10)}{4(x+2)^2} = \frac{(x-1)(-x-5)}{2(x+2)^2}$$

ដោយ $2(x+2)^2 > 0, \forall x \in D_f$ នោះ $f'(x)$ មានសញ្ញា

ដូច $(x-1)(-x-5)$ ។

បើ $f'(x) = 0$; $(x-1)(-x-5) = 0$

$$\Rightarrow \begin{cases} x-1=0 \Rightarrow x=1 \\ -x-5=0 \Rightarrow x=-5 \end{cases}$$

សញ្ញានៃ $f'(x)$

x	$-\infty$	-5	-2	1	$+\infty$
$x-1$	$-$	$-$	$-$	0	$+$
$-x-5$	$+$	0	$-$	$-$	$-$
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$

គណនាតំលៃបរមា

$$x = -5; f(-5) = 6$$

$$x = 1; f(1) = 0$$

គណនាលីមីត និងអាស៊ីមតូត

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{x^2 - 2x + 1}{-2x - 4} = \pm\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -2} f(x) = \lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^2 - 2x + 1}{-2x - 4} = \pm\infty$$

$\Rightarrow$ បន្ទាត់ $x = -2$ ជាអាស៊ីមតូតឈរនៃក្រាប (c) ។

អាស៊ីមតូតទ្រេត

$$f(x) = \frac{x^2 - 2x + 1}{-2x - 4} = -\frac{1}{2}x + 2 + \frac{9}{-2x - 4}$$

$$\text{ដោយ } \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{9}{-2x - 4} = 0$$

$\Rightarrow$ បន្ទាត់ $y = -\frac{1}{2}x + 2$ ជាអាស៊ីមតូតទ្រេតនៃក្រាប (c) ។


ដូចនេះ

បន្ទាត់ $y = -\frac{1}{2}x + 2$ ជាអាស៊ីមតូតទ្រេតនៃក្រាប (c)

តារាងអថេរភាពនៃ $f(x)$

x	$-\infty$	-5	-2	1	$+\infty$	
$f'(x)$	$-$	0	$+$	$+$	0	$-$
$f(x)$	$+\infty$	$\searrow$	6	$\nearrow$	$+\infty$	
				0	$\searrow$	$-\infty$
				$-\infty$		$-\infty$

សង់ខ្សែកោង(c) តាងអនុគមន៍



ស្រាយបញ្ជាក់ថា ខ្សែកោងនេះមានផ្ចិតឆ្លុះមួយ

ផ្ចិតឆ្លុះនៃខ្សែកោងនេះ ជាចំណុចប្រសព្វរវាងអាស៊ីមតូតង្គក និង
អាស៊ីមតូតទ្រេត ។ យក $I(x_0; y_0)$ ជាផ្ចិតឆ្លុះនៃក្រាប(c)

$$\text{គេបាន } x = -2 \quad y = -\frac{1}{2}(-2) + 2 = 1 + 2 = 3$$

$$\Rightarrow I(-2; 3)$$

ចំណុច $I(-2; 3)$ ជាផ្ចិតឆ្លុះកាលណាផ្ទៀងផ្ទាត់

$$f(-4-x) + f(x) = 2 \times 3$$

$$f(-4-x) + f(x) = 6 \quad (1)$$

គណនា :

$$f(-4-x) + f(x) = \frac{(-4-x)^2 - 2(-4-x) + 1}{-2(-4-x) - 4} + f(x)$$

$$= \frac{16 + 8x + x^2 + 8 + 2x + 1}{8 + 2x - 4} + f(x)$$

$$= \frac{x^2 + 10x + 25}{2x + 4} + f(x) = \frac{-(x^2 + 10x + 25)}{-2x - 4} + f(x)$$

$$= \frac{-x^2 - 10x - 25}{-2x - 4} + \frac{x^2 - 2x + 1}{-2x - 4} = \frac{-12x - 24}{-2x - 4}$$

- 129 -

$$= \frac{6(-2x-4)}{(-2x-4)} = 6 \quad (2)$$

តាម(1)និង(2)បង្ហាញថា $I(-2;3)$ ជាផ្ចិតឆ្លុះនៃខ្សែកោង(c)

ដូចនេះ បង្ហាញថា ខ្សែកោង(c) មានផ្ចិតឆ្លុះមួយគឺ $I(-2;3)$

ខ. កំណត់សមីការបន្ទាត់ប៉ះនឹងខ្សែកោង(c)

សមីការបន្ទាត់ប៉ះមានទំរង់ (T) : $y = ax + b$

ដោយដឹងថា (T) កាត់តាមចំណុច $A(0;2)$

$$\text{គេបាន } 2 = 0 \times a + b \Leftrightarrow b = 2$$

$$\text{តែតាមរូបមន្ត(T) : } y = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0)$$

$$\Leftrightarrow (T) : x f'(x_0) - x_0 f'(x_0) + f(x_0)$$

$$\text{គេទាញបាន : } -x_0 f'(x_0) + f(x_0) = b = 2$$

$$-x_0 f'(x_0) + f(x_0) = 2$$

$$\frac{-x_0(x_0 - 1)(-x_0 - 5)}{2(x_0 + 2)^2} + f(x_0) = 2$$

$$\frac{x_0(x_0 - 1)(x_0 + 5)}{2(x_0 + 2)^2} + f(x_0) = 2$$

$$\frac{x_0(x_0^2 + 4x_0 - 5)}{2(x_0 + 2)^2} + \frac{x_0^2 - 2x_0 + 1}{-2x_0 - 4} = 2$$

$$\frac{x_0^3 + 4x_0^2 - 5x_0}{2(x_0 + 2)^2} + \frac{x_0^2 - 2x_0 + 1}{-2(x_0 + 2)} = 2$$

$$\frac{x_0^3 + 4x_0^2 - 5x_0}{2(x_0 + 2)^2} + \frac{-(x_0 + 2)(x_0^2 - 2x_0 + 1)}{2(x_0 + 2)^2} = 2$$

$$\frac{x_0^3 + 4x_0^2 - 5x_0 - x_0^3 + 3x_0 - 2}{2(x_0 + 2)^2} = 2$$

$$\frac{4x_0^2 - 2x_0 - 2}{2(x_0 + 2)^2} = 2$$

$$4x_0^2 - 2x_0 - 2 = 4(x_0 + 2)^2$$

$$2x_0^2 - x_0 - 1 = 2(x_0^2 + 4x_0 + 4)$$

$$2x_0^2 - x_0 - 1 - 2x_0^2 - 8x_0 - 8 = 0$$

$$-9x_0 - 9 = 0 \Leftrightarrow 9x_0 = -9 \Rightarrow x_0 = \frac{-9}{9} = -1$$

$$x_0 = -1$$

$$\text{គេបាន: } f'(-1) = \frac{(-2)(-4)}{2} = 4$$

$$f(-1) = \frac{1+2+1}{2-4} = \frac{4}{-2} = -2$$

$$\Rightarrow (T): y = 4(x+1) - 2$$

$$(T): y = 4x + 4 - 2$$

$$(T): y = 4x + 2$$

ដូចនេះ

$$\text{សមីការបន្ទាត់ប៉ះ (T): } y = 4x + 2$$

គ. គណនាផ្ទៃក្រឡា S

$$\begin{aligned} S &= \int_3^4 \left(-\frac{1}{2}x + 2 - \frac{x^2 - 2x + 1}{-2x - 4} \right) dx \\ &= \int_3^4 \left(\frac{(-x-2)(-x+4) - (x^2 - 2x + 1)}{-2x - 4} \right) dx \\ &= \int_3^4 \frac{(x^2 - 2x - 8) - (x^2 - 2x + 1)}{-2x - 4} dx \\ &= \int_3^4 \left(\frac{-9}{-2x - 4} \right) dx = \frac{9}{2} \int_3^4 \left(\frac{1}{x+2} \right) dx \end{aligned}$$

$$= \frac{9}{2} \ln |x + 2| \Big|_3^4 = \frac{9}{2} (\ln 6 - \ln 5) = \frac{9}{2} \ln \frac{6}{5}$$

ដូចនេះ

$$S = \frac{9}{2} \ln \frac{6}{5} \text{ (ឯកតាផ្ទៃ)}$$

វិញ្ញាសាទី១០

ប្រឡងជ្រើសរើសគ្រូបឋមសិក្សា និងមត្តេយ្យសិក្សា

សម័យប្រឡង: ១៥ ធ្នូ ២០០៥

រយៈពេល: ២ ម៉ោង



1. ក. ដោះស្រាយសមីការក្នុងសំណុំកុំផ្លិច $x^2 - 2x + 5 = 0$
- ខ. កំណត់តម្លៃ a និង b ដើម្បីអោយ $2 - i$ ជាឫសនៃសមីការ $ax^2 + bx - 20 = 0$

គ. សរសេរ $Z = \left(\frac{1+i}{1-i}\right)^3$ ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ ។

2. ចូរសង់ក្រាបតាងអនុគមន៍ $f(x) = |x|$ ចូរស្រាយបញ្ជាក់ថា អនុគមន៍ $f(x)$ ជាអនុគមន៍ជាប់ តែគ្មានដេរីវេត្រង់ចំណុច $x=0$
3. ក្នុងថង់មួយមានប៊ូលពណ៌ស 12 និង មានប៊ូលពណ៌ខ្មៅ 15 ។ គេចាប់យកចេញពីក្នុងថង់នូវប៊ូលពីរជាមួយគ្នា ។ តើគេមានប៉ុន្មានរបៀបដើម្បីចាប់យកចេញអោយបានយ៉ាងតិចបំផុតប៊ូលពណ៌ស 1 ។
4. ក្នុងតំរុយអរតូណរម៉ាល់ $(0; \vec{i}; \vec{j}; \vec{k})$ ។ គេមានចំណុច $A(4; -2; 0)$ $B(1; 2; 2)$; $C(2; -1; 0)$ និង $D(2; -2; -1)$ ។

ក. កំណត់សមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្រនៃបន្ទាត់ (d) ដែលកាត់តាមចំណុច A ហើយមានវ៉ិចទ័រប្រាប់ទិស $\vec{CD}$

ខ. សរសេរសមីការប្លង់ (P) ដែលកាត់តាមចំណុច B ហើយកែងបន្ទាត់ (CD)

គ. រកកូអរដោនេនៃចំណុចប្រសព្វរវាងបន្ទាត់ (d) និងប្លង់ (P)

*5. គេអោយអនុគមន៍ $f_m(x) = \ln(x^2 + 4x + m)$

ក. កំណត់តម្លៃ m ដើម្បីអោយអនុគមន៍នេះមានដែនកំណត់
ស្មើចំនួនពិត R ។

ខ. ចំពោះតម្លៃ $m = 0$ ដោះស្រាយសមីការ

$$f_m(x) = \ln(x+2) + \ln 2$$

គ. ស្រាយបញ្ជាក់ថាអនុគមន៍

$$F(x) = 2[(x+2)\ln|x+2| - x]$$

ជាព្រីមីទីវនៃអនុគមន៍ $f(x) = \ln(x^2 + 4x + 4)$ ។

ចំណើយ

1. ក. ដោះស្រាយសមីការក្នុងសំណុំកុំផ្លិច

$$x^2 - 2x + 5 = 0$$

$$\Delta' = (-1)^2 - 5 = -4 = (2i)^2$$

$$\Rightarrow x_1 = 1 - 2i; x_2 = 1 + 2i$$

ដូចនេះ

$$x_1 = 1 - 2i; x_2 = 1 + 2i$$

ខ. កំណត់តម្លៃ a និង b

ដើម្បីអោយ $2-i$ ជាឫសសមីការ $ax^2 + bx - 20 = 0$

$$\text{កាលណា } a(2-i)^2 + b(2-i) - 20 = 0$$

$$a(4-4i-1) + b(2-i) - 20 = 0$$

$$3a - 4ai + 2b - bi - 20 = 0$$

$$(3a + 2b - 20) + (-4a - b)i = 0$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 3a + 2b - 20 = 0 \\ -4a - b = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -4 \\ b = 16 \end{cases}$$

ដូចនេះ

$$a = -4; b = 16$$

គ. សរសេរ $Z = \left(\frac{1+i}{1-i}\right)^3$ ជានប្រភេទត្រីកោណមាត្រ

$$\text{គេមាន } \frac{1+i}{1-i} = \frac{(1+i)^2}{1+1} = \frac{1+2i-1}{2} = i$$

$$= 0 + i = \cos \frac{\pi}{2} + i \sin \frac{\pi}{2}$$

$$\text{គេបាន } Z = \left(\cos \frac{\pi}{2} + i \sin \frac{\pi}{2}\right)^3 = \left(\cos \frac{3\pi}{2} + i \sin \frac{3\pi}{2}\right)$$


ដូចនេះ

$$Z = \left(\cos \frac{3\pi}{2} + i \sin \frac{3\pi}{2} \right)$$

2. សង់ក្រាបតាងអនុគមន៍ $y = f(x) = |x|$

តាមតំលៃលេខជំនួយ

x	-3	-2	-1	0	1	2	3
y	3	2	1	0	1	2	3



ចូរស្រាយបញ្ជាក់ថា អនុគមន៍ $f(x)$ ជាអនុគមន៍ជាប់

តែគ្មានដេរីវេត្រង់ចំណុច $x = 0$

គេមាន $f(0) = 0$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} |x| = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} |x| = 0$$

$$\text{ដោយ } \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = f(0) = 0$$

$$\Rightarrow f \text{ ជាអនុគមន៍ជាប់ត្រង់ } x = 0 \quad (1)$$

ដេរីវេខាងឆ្វេងត្រង់ $x = 0$

$$f'(0^-) = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(h+0) - f(0)}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{|h|}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^-} (-1) = -1$$

$$f'(0^+) = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(h+0) - f(0)}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{|h|}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} (1) = 1$$

ដោយ $f'(0^-) = -1 \neq f'(0) = 1$

$\Rightarrow f$ គ្មានដេរីវេត្រង់ $x = 0$ (2)

តាម (1) និង (2) គេបាន អនុគមន៍ $f(x)$ ជាអនុគមន៍ជាប់

តែគ្មានដេរីវេត្រង់ចំណុច $x = 0$ ។

ដូចនេះ បង្ហាញថា អនុគមន៍ $f(x)$ ជាអនុគមន៍ជាប់

តែគ្មានដេរីវេត្រង់ចំណុច $x = 0$ ។

3. រកចំនួនករណីដែលគេអាចចាប់បានប៊ូលសមួយយ៉ាងតិច

គេចាប់ប៊ូលសមួយយ៉ាងតិចមានន័យថា គេអាចចាប់បាន:

ប៊ូលស1 ខ្មៅ1 ឬ ប៊ូលសទាំង2

គេបាន $n(S) = C(12;1) \times C(15;1) + C(12;2)$

$$= (12 \times 15) + \frac{12!}{10!2!} = 180 + \frac{11 \times 12}{2} = 246$$

ដូចនេះ

គេអាចចាប់បានប៊ូលសមួយយ៉ាងតិច

បានចំនួន 246 របៀប

4. គេអោយចំណុច $A(4;-2;0); B(1;2;2); C(2;-1;0)$

និង $D(2;-2;-1)$ គេបាន $\overrightarrow{CD}(0;-1;-1)$

ក. កំណត់សមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្របន្ទាត់ (d)

បន្ទាត់ (d) កាត់តាមចំណុច $A(4;-2;0)$ ហើយមានវ៉ិចទ័រ

ប្រាប់ទិស $\overrightarrow{CD}(0;-1;-1)$ កំណត់ដោយ:

$$(d): \begin{cases} x = x_0 + at \\ y = y_0 + bt \\ z = z_0 + ct; (t \in R) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 4 \\ y = -2 - t \\ z = -t \end{cases}$$

ដូចនេះ $(d): x = 4; y = -2 - t; z = -t; (t \in R)$

ខ. សរសេរសមីការប្លង់ (P)

ប្លង់ (P) កាត់តាម $B(1;2;2)$ ហើយកែងនឹង $\overrightarrow{CD}(0;-1;-1)$

កំណត់ដោយ: $(P): 0(x-1) - (y-2) - (z-2) = 0$

$$(P): -y - z + 2 + 2 = 0$$

$$(P): y + z - 4 = 0$$

ដូចនេះ

$$(P): y + z - 4 = 0$$

គ. រកកូអរដោនេចំណុចប្រសព្វរវាងបន្ទាត់(d)និងប្លង់ (P)

តាង $M(x_0; y_0; z_0)$ ជាចំណុចប្រសព្វ

$$\text{ប្លង់ } (P): y + z - 4 = 0$$

$$\text{បន្ទាត់ } (d): x = 4; y = -2 - t; z = -t$$

$$(P) \cap (d): (-2 - t) + (-t) - 4 = 0$$
$$-t - t - 2 - 4 = 0$$

$$-2t = 6 \Rightarrow t = \frac{-6}{2} = -3$$

$$\Rightarrow x_0 = 4; y_0 = 1; z = 3$$

ដូចនេះ

$$M(4; 1; 3)$$

5. គេអោយអនុគមន៍ $f_m(x) = \ln(x^2 + 4x + m)$

ក. កំណត់តម្លៃ m

ដើម្បីអោយ f_m មានដែនកំណត់ស្មើចំនួនពិត R លុះត្រាតែ

$$x^2 + 4x + m > 0$$

$$\Delta' = 2^2 - m = 4 - m$$

ដើម្បីអោយ $x^2 + 4x + m > 0$ លុះត្រាតែ $\Delta' < 0$

$$\text{គេបាន } 4 - m < 0 \Rightarrow m > 4$$

ដូចនេះ

f_m មានដែនកំណត់ស្មើចំនួនពិត R លុះត្រាតែ $m > 4$

ខ. ចំពោះ $m = 0$ ដោះស្រាយសមីការ

$$f_m(x) = \ln(x+2) + \ln 2$$

$$\Leftrightarrow \ln(x^2 + 4x) = \ln 2(x+2)$$

$$x^2 + 4x = 2x + 4$$

$$x^2 + 2x - 4 = 0$$

$$\Delta' = 1^2 + 4 = 5$$

$$\Rightarrow x_1 = -1 - \sqrt{5}; x_2 = -1 + \sqrt{5}$$

ដូចនេះ

$$x_1 = -1 - \sqrt{5}; x_2 = -1 + \sqrt{5}$$

គ. ស្រាយបញ្ជាក់ថា $F(x)$ ជាព្រីមីទីវនៃ $f(x)$

$$\text{គេមាន } F(x) = 2[(x+2)\ln|x+2| - x]$$

$$f(x) = \ln(x^2 + 4x + 4)$$

$$\text{ដោយ } F'(x) = 2\left(\ln|x+2| + \frac{1}{x+2}(x+2) - 1\right)$$

$$= 2\ln|x+2|$$

$$= \ln(x+2)^2$$

$$= \ln(x^2 + 4x + 4) = f(x)$$

$$\text{ដោយ } F'(x) = f(x)$$

នាំអោយ $F(x)$ ជាព្រីមីទីវនៃ $f(x)$

ដូចនេះ

បង្ហាញថា $F(x)$ ជាព្រីមីទីវនៃ $f(x)$

វិញ្ញាសាទី១១

ប្រឡងជ្រើសរើសគ្រូបឋមសិក្សា និងមធ្យមសិក្សា

សម័យប្រឡង: ១៨ វិច្ឆិកា ២០០៦

រយៈពេល: ២ ម៉ោង



១. ក. កំណត់ចំនួនកុំផ្លិច Z ដែល $Z; \frac{1}{Z}$ និង $1 - Z$ មានម៉ូឌុលស្មើគ្នា

ខ. ដោះស្រាយសមីការ $|x| - x = 1 + 2i$ ដែល x ជាចំនួនកុំផ្លិច

គ. គេឱ្យបីចំនួន $a; b; c$ ផ្ទៀងផ្ទាត់ទំនាក់ទំនង $abc = 1$

ស្រាយបញ្ជាក់ថា $\frac{1}{1+a+ab} + \frac{1}{1+b+bc} + \frac{1}{1+c+ca} = 1$

*2. គេឱ្យអនុគមន៍ $f(x) = \ln\left(x + \sqrt{1+x^2}\right)$

ក. រកដែនកំណត់នៃអនុគមន៍ $f(x)$

ខ. បង្ហាញថា f ជាអនុគមន៍សេស និងជាអនុគមន៍កើន ។

3. ក. កំណត់សមីការបន្ទាត់ (T) ដែលប៉ះខ្សែកោងតាងអនុគមន៍

$y = \frac{e^x}{1 - \sin x}$ ត្រង់ចំណុចដែលមានអាប់ស៊ីសស្មើ $x = 0$ ។

ខ. រកកូអរដោនេនៃចំណុចប្រសព្វ M រវាងបន្ទាត់(T)និងខ្សែកោងតាងអនុគមន៍ $y = 2x + 1 + \ln(x - 1)$ ។

4. គេមានការេមួយជ្រុងស្មើ a ។ នៅក្នុងការេនោះគេសង់ការេមួយទៀតដែលមានកំពូលវាជាចំណុចកណ្តាលជ្រុងនៃការេមុន ។ គេសង់ការេរបៀបនេះរហូតដល់បាន n ការេ ។

ក. គណនាផ្ទៃក្រឡាការេទី n

ខ. គណនាផលបូកផ្ទៃក្រឡាទាំងអស់ ។

5. ក្នុងលំហប្រដាប់ដោយតំរុយអរតូណរម៉ាល់វិជ្ជមាន($0; \vec{i}; \vec{j}; \vec{k}$) ។

គេឱ្យចំណុច $A(3;2;0)$ និង $B(0;-1;3)$ ។

ក. រកសមីការប្លង់ (Q)ដែលកាត់តាមចំណុច A ហើយកែងនឹងបន្ទាត់ (AB)

ខ. គេឱ្យចំណុច $R(5;0;0); S(0;5;0)$ និង $T(0;0;-5)$ ។

ផ្ទៀងផ្ទាត់ថាចំណុច $R; S; T$ ជាចំណុចរបស់ប្លង់(Q)

គ. គណនាប្រវែង AB និងផ្ទៃក្រឡាត្រីកោណ RST ។

ចំណើយ

1. ក. កំណត់ចំនួនកុំផ្លិច Z

តាង $Z = a + bi; (a, b \in R)$

$$\text{គេបាន } \frac{1}{Z} = \frac{1}{a + bi} = \frac{a - bi}{a^2 + b^2} = \frac{a}{a^2 + b^2} - \frac{b}{a^2 + b^2}i$$

$$1 - Z = 1 - a - bi$$

$$\text{ម៉ូឌុលនៃ } Z \text{ គឺ } r_1 = \sqrt{a^2 + b^2}$$

$$\text{ម៉ូឌុលនៃ } \frac{1}{Z} \text{ គឺ } r_2 = \sqrt{\left(\frac{a}{a^2 + b^2}\right)^2 + \left(\frac{b}{a^2 + b^2}\right)^2}$$

$$\text{ម៉ូឌុលនៃ } 1 - Z \text{ គឺ } r_3 = \sqrt{(1 - a)^2 + b^2}$$

$$\text{តាមបំរាប } r_1 = r_2 = r_3$$

គេបាន:

$$\begin{cases} r_2 = r_1 \\ r_3 = r_1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \sqrt{\left(\frac{a}{a^2 + b^2}\right)^2 + \left(\frac{b}{a^2 + b^2}\right)^2} = \sqrt{a^2 + b^2} \\ \sqrt{(1 - a)^2 + b^2} = \sqrt{a^2 + b^2} \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \frac{a^2}{(a^2 + b^2)^2} + \frac{b^2}{(a^2 + b^2)^2} = a^2 + b^2 \\ 1 - 2a + a^2 + b^2 = a^2 + b^2 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \frac{1}{(a^2 + b^2)^2} = 1 \\ 1 - 2a = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} (a^2 + b^2)^2 = 1 \\ a = \frac{1}{2} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \left(\frac{1}{4} + b^2 \right)^2 = 1 \Leftrightarrow \frac{1}{4} + b^2 = 1$$

$$b^2 = 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4} \Rightarrow b = \pm \frac{\sqrt{3}}{4}$$

គេបាន $Z_1 = \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i; Z_2 = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$

ដូចនេះ

$$Z_1 = \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i; Z_2 = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$$

ខ. ដោះស្រាយសមីការ $|x| - x = 1 + 2i$

តាង $x = a + bi; (a, b \in R) \Rightarrow |x| = \sqrt{a^2 + b^2}$

គេបាន $|x| - x = 1 + 2i$

$$\Leftrightarrow \sqrt{a^2 + b^2} - (a + bi) = 1 + 2i$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \sqrt{a^2 + b^2} - a = 1 \\ -b = 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \sqrt{a^2 + b^2} = a + 1 \\ b = -2 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \sqrt{a^2 + 4} = a + 1$$

$$\Leftrightarrow a^2 + 4 = (a + 1)^2$$

$$\Leftrightarrow a^2 + 4 = a^2 + 2a + 1$$

$$2a = 4 - 1 \Rightarrow a = \frac{3}{2}$$

$$\text{គេបាន } x = \frac{3}{2} - 2i$$

ដូចនេះ

$$x = \frac{3}{2} - 2i$$

គ. ស្រាយបញ្ជាក់ថា:

$$\frac{1}{1+a+ab} + \frac{1}{1+b+bc} + \frac{1}{1+c+ca} = 1$$

គណនា: $\frac{1}{1+a+ab} + \frac{1}{1+b+bc} + \frac{1}{1+c+ca}$

$$= \frac{c}{c+ca+1} + \frac{1}{1+b+bc} + \frac{1}{1+c+ca}$$

$$= \frac{c+1}{1+c+ca} + \frac{1}{1+b+bc} = \frac{b(c+1)+1}{1+b+bc} = \frac{bc+b+1}{1+b+bc}$$

$$= \frac{1+b+bc}{1+b+bc} = 1$$

ដូចនេះ បង្ហាញថា:

$$\boxed{\frac{1}{1+a+ab} + \frac{1}{1+b+bc} + \frac{1}{1+c+ca} = 1}$$

2. គេឱ្យអនុគមន៍ $f(x) = \ln\left(x + \sqrt{1+x^2}\right)$

ក. រកដែនកំណត់នៃអនុគមន៍ f

អនុគមន៍ f មានន័យកាលណា $x + \sqrt{1+x^2} > 0$

ដោយ $1 + x^2 > 0, \forall x \in R$

ម្យ៉ាងទៀត $\sqrt{1 + x^2} > x$ នោះនាំអោយ $x + \sqrt{1 + x^2} > 0$

ដូចនេះ $D_f = R$

ខ. បង្ហាញថា f ជាអនុគមន៍សេស និងជាអនុគមន៍កើន

អនុគមន៍ f ជាអនុគមន៍សេសកាលណាផ្ទៀងផ្ទាត់

$$f(-x) = -f(x)$$

$$\text{គណនា: } f(-x) = \ln\left(-x + \sqrt{1 + x^2}\right)$$

$$= \ln\left[\frac{\left(-x + \sqrt{1 + x^2}\right)\left(x + \sqrt{1 + x^2}\right)}{x + \sqrt{1 + x^2}}\right]$$

$$= \ln\left(\frac{-x^2 + 1 + x^2}{x + \sqrt{1 + x^2}}\right) = \ln\left(\frac{1}{x + \sqrt{1 + x^2}}\right)$$

$$= \ln\left(x + \sqrt{1+x^2}\right)^{-1} = -\ln\left(x + \sqrt{1+x^2}\right) = -f(x)$$

ដោយ $f(-x) = -f(x)$

ដូចនេះ បង្ហាញថា f ជាអនុគមន៍សសេស ។

គណនាដេរីវេនៃ f :

$$f'(x) = \frac{\left(x + \sqrt{1+x^2}\right)'}{\left(x + \sqrt{1+x^2}\right)} = \frac{1 + \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}}{x + \sqrt{1+x^2}}$$

$$= \frac{\sqrt{1+x^2} + x}{\sqrt{1+x^2}\left(x + \sqrt{1+x^2}\right)} = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$$

$$f'(x) = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} > 0, \forall x \in \mathbb{R} \Rightarrow f \text{ ជាអនុគមន៍កើន}$$

ដូចនេះ

បង្ហាញថា f ជាអនុគមន៍កើន

3. ក. រកសមីការបន្ទាត់ប៉ះ(T)

$$\text{តាមរូបមន្ត } (T): y = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0)$$

$$\text{គេមាន } f(x) = \frac{e^x}{1 - \sin x}$$

$$\Rightarrow f'(x) = \frac{e^x(1 - \sin x) - e^x(-\cos x)}{(1 - \sin x)^2}$$

$$f'(x) = \frac{e^x(1 - \sin x + \cos x)}{(1 - \sin x)^2}$$

$$\text{គេបាន } f'(0) = 2; f(0) = 1$$

$$\Rightarrow (T): y = 2(x - 0) + 1$$

$$(T): y = 2x + 1$$

ដូចនេះ

$$(T): y = 2x + 1$$

ខ. រកកូអរដោនេនៃចំណុច M

$$(T): y = 2x + 1 \text{ ប្រសព្វនឹង } y = 2x + 1 + \ln(x - 1)$$

$$\text{គេបាន } 2x + 1 = 2x + 1 + \ln(x - 1)$$

$$\ln(x-1) = 0$$

$$x-1=1 \Rightarrow x=2$$

$$\Rightarrow y = 2 \times 2 + 1 = 5$$

ដូចនេះ កូអរដោនេចំណុច M គឺ $M(2;5)$

4. ក. គណនាផ្ទៃក្រឡាការេទី n

តាង $x_1; x_2; x_3; \dots; x_n$ ជាផ្ទៃក្រឡាការេបន្តបន្ទាប់

តាមលក្ខណៈការេ គេបានផ្ទៃក្រឡាការេទី:

ទី 1 គឺ $x_1 = a^2$

ទី 2 គឺ $x_2 = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2 a^2$

ទី 3 គឺ $x_3 = \left[\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2\right]^2 a^2$

ទី 4 គឺ $x_4 = \left[\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^3\right]^2 a^2$

$$\text{ទី } 5 \text{ គឺ } x_5 = \left[\left(\frac{\sqrt{2}}{2} \right)^4 \right]^2 a^2$$

$$\text{ទី } n \text{ គឺ } x_n = \left[\left(\frac{\sqrt{2}}{2} \right)^{n-1} \right]^2 a^2$$

ដូចនេះ ផ្ទៃក្រឡាការេទី n គឺ

$$x_n = \left[\left(\frac{\sqrt{2}}{2} \right)^{n-1} \right]^2 a^2$$

ខ. គណនាផលបូកផ្ទៃក្រឡាការេទាំងអស់

$$S_n = x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + \dots + x_n$$

$$= a^2 + \left(\frac{\sqrt{2}}{2} \right)^2 a^2 + \left[\left(\frac{\sqrt{2}}{2} \right)^2 \right]^2 a^2$$

$$+ \left[\left(\frac{\sqrt{2}}{2} \right)^3 \right]^2 a^2 + \dots + \left[\left(\frac{\sqrt{2}}{2} \right)^{n-1} \right]^2 a^2$$

$$= a^2 \left[1 + \left(\frac{\sqrt{2}}{2} \right)^2 + \left(\frac{\sqrt{2}}{2} \right)^4 + \dots + \left(\frac{\sqrt{2}}{2} \right)^{2n+2} \right]$$

តាមរូបមន្ត $S_n = \frac{u_1(q^n - 1)}{q - 1}$

ដោយ $u_1 = 1$ និង $q = \left(\frac{\sqrt{2}}{2} \right)^2$

$$\text{គេបាន } S_n = a^2 \left[\frac{\left(\frac{\sqrt{2}}{2} \right)^{2n} - 1}{\left(\frac{\sqrt{2}}{2} \right)^2 - 1} \right]$$

ដូចនេះ ផលបូកផ្ទៃក្រឡាការេទាំងអស់គឺ

$$S_n = a^2 \left[\frac{\left(\frac{\sqrt{2}}{2} \right)^{2n} - 1}{\left(\frac{\sqrt{2}}{2} \right)^2 - 1} \right] \text{ (ឯកតាផ្ទៃ)}$$

5. ក. រកសមីការប្លង់(Q)

ប្លង់ (Q) កាត់តាមចំណុច $A(3;2;0)$ ហើយកែងនឹង

$\rightarrow AB(-3;-3;3)$ កំណត់ដោយ:

$$(Q): -3(x-3) - 3(y-2) + 3(z-0) = 0$$

$$(Q): -3x - 3y + 3z + 9 + 6 = 0$$

$$(Q): -3x - 3y + 3z + 15 = 0$$

$$(Q): x + y - z - 5 = 0$$

ដូចនេះ: $(Q): x + y - z - 5 = 0$

ខ. ផ្ទៀងផ្ទាត់ថាចំណុច $R; S; T$ ជាចំណុចរបស់ប្លង់ (Q)

យកចំណុច $R(5;0;0); S(0;5;0)$ និង $T(0;0;-5)$ ជំនួស

ក្នុងប្លង់ (Q) គេបាន:

$$\begin{cases} 5 + 0 + 0 - 5 = 0 \\ 0 + 5 + 0 - 5 = 0 \\ 0 + 0 + 5 - 5 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 0 = 0 \\ 0 = 0 \\ 0 = 0 \end{cases} \quad \text{ពិត}$$

ដូចនេះ:

បង្ហាញថា ចំណុច $R; S; T$ ជាចំណុចរបស់ប្លង់ (Q)

គ. គណនាប្រវែង AB និងផ្ទៃក្រឡាត្រីកោណ RST

$$AB = \left\| \vec{AB} \right\| = \sqrt{(-3)^2 + (-3)^2 + 3^2}$$

$$= \sqrt{3^2 \times 3} = 3\sqrt{3}$$

ដូចនេះ $AB = 3\sqrt{3}$ (ឯកតាប្រវែង)

គេមាន $\vec{RS}(-5;5;0); \vec{RT}(-5;0;-5)$

គេបាន

$$\vec{RS} \times \vec{RT} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ -5 & 5 & 0 \\ -5 & 0 & -5 \end{vmatrix} = -25\vec{i} - 25\vec{j} + 25\vec{k}$$

ផ្ទៃក្រឡាត្រីកោណ RST កំណត់ដោយ $S_{RST} = \frac{1}{2} \left\| \vec{RS} \times \vec{RT} \right\|$

ដោយ $\left\| \vec{RS} \times \vec{RT} \right\| = \sqrt{(-25)^2 + (-25)^2 + (25)^2}$

$$= \sqrt{3 \times (25)^2} = 25\sqrt{3}$$

Judv = ឃ - ១៧

ដូចនេះ

$$S_{RST} = \frac{25\sqrt{3}}{2} \text{ (ឯកតាផ្ទៃ)}$$

ប្រឡងជ្រើសរើសគ្រូបឋមសិក្សា និងមត្តេយ្យសិក្សា

សម័យប្រឡង: ១៦ វិច្ឆិកា ២០០៧

រយៈពេល: ២ ម៉ោង



១. ក. គេអោយ $P(Z) = Z^2 + 2(2+i)Z + 3 + 4i$

ដោយ Z ជាចំនួនកុំផ្លិច ។ បញ្ជាក់ថា $P(Z)$ ជាការេនៃពហុធាដឺក្រេទីមួយ ។

ខ. គេឱ្យចំនួនកុំផ្លិច $Z = 1 + i$ ។ បង្ហាញថា $Z^3 = -2 + 2i$ ។

ចំពោះតំលៃ Z នេះ រកចំនួនពិត a និង b ដោយដឹងថា

$$\frac{a}{1+Z} + \frac{b}{1+Z^3} = 2i$$

2. ក. គណនាអាំងតេក្រាលមិនកំណត់:

$$I = \int x^2 \ln x dx$$

$$J = \int \frac{\sin 2x - \cos x}{\cos x} dx$$

ខ. គេឱ្យ $g(x) = \frac{x^2 + x - 6}{x^2 - 2x - 3}$ ។ កំណត់ចំនួនពិត $m; n; p$

ដើម្បីឱ្យបាន $g(x) = m + \frac{n}{x+1} + \frac{p}{x-3}$

ចំពោះគ្រប់ $x \in]-1; 3[$ រួចគណនា $\int_0^2 g(x) dx$ ។

3. * គេចង់ជ្រើសរើសយកសិស្ស 3 នាក់ ក្នុងចំណោមសិស្ស 12 នាក់
ដែលក្នុងនោះមានសិស្សប្រុស 7 នាក់ និងសិស្សស្រី 5 នាក់ ។
រកប្រូបាបដែលគេជ្រើសរើសបានសិស្សប្រុស 2 នាក់ និងសិស្សស្រី 1

4. គេឱ្យអនុគមន៍ $f(x) = 1 + 2x + 3x^2 + \dots + nx^{n-1}$

ក. កំណត់តំលៃ $a_1; a_2; a_3; \dots; a_n$ ដើម្បីឱ្យអនុគមន៍

$$F(x) = a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + \dots + a_nx^n$$

ជាព្រីមីទីវនៃអនុគមន៍ $f(x)$ ។

ខ. ចំពោះតំលៃ $a_1; a_2; a_3; \dots; a_n$ ដែលរកឃើញក្នុងសំណួរ (ក)

បង្ហាញថា $f(x) = \frac{nx^{n+1} - (n+1)x^n + 1}{(1-x)^2}$ ។

5. * ក្នុងលំហប្រដាប់ដោយតំរុយអរតូណរម៉ាលីវិជ្ជមាន $(0; \vec{i}; \vec{j}; \vec{k})$ ។

គេឱ្យបន្ទាត់ពីរ:

$$(D_1): \frac{x}{1} = \frac{y-1}{-2} = \frac{z}{3} \text{ និង } (D_2): \begin{cases} 3x + y - 5z + 1 = 0 \\ 2x + 3y - 8z + 3 = 0 \end{cases}$$

ក. ស្រាយបញ្ជាក់ថាបន្ទាត់ (D_1) និង (D_2) អន្តរក្នុងគ្នា

ខ. តើបន្ទាត់ (D_1) និង (D_2) កាត់គ្នាឬទេ ?

គ. ប្លង់ (P) មួយមានសមីការ $2x + 3y + z - 12 = 0$ ។

រកចំងាយពីគល់តម្រុយ 0 ទៅប្លង់ (P) ។

ចំណើយ

1. ក. បញ្ជាក់ថា $P(Z)$ ជាការេនៃពហុធានីក្រេទីមួយ

$$\begin{aligned} \text{គេមាន } P(Z) &= Z^2 + 2(2+i)Z + 3 + 4i \\ &= Z^2 + 2(2+i)Z + 4 + 4i + i^2 \\ &= Z^2 + 2(2+i)Z + (2+i)^2 \\ &= [Z + (2+i)]^2 \quad (\text{ពិនិត្យ}) \end{aligned}$$

ដូចនេះ

បញ្ជាក់ថា $P(Z)$ ជាការេនៃពហុធានីក្រទីមួយ

ខ. បង្ហាញថា $Z^3 = -2 + 2i$

គេមាន $Z = 1 + i$

$$\Rightarrow Z^3 = (1 + i)^3 = 1 + 3i + 3i^2 + i^3$$

$$= 1 + 3i - 3 - i = -2 + 2i$$

ដូចនេះ បង្ហាញថា

$$Z^3 = -2 + 2i$$

រកតំលៃនៃចំនួនពិត a និង b

គេមាន $\frac{a}{1+Z} + \frac{b}{1+Z^3} = 2i$

$$\Leftrightarrow \frac{a}{1+1+i} + \frac{b}{1-2+2i} = 2i$$

$$\Leftrightarrow \frac{a}{2+i} + \frac{b}{-1+2i} = 2i$$

$$\frac{a}{1+1+i} + \frac{b}{1-2+2i} = 2i$$

$$\frac{a}{2+i} + \frac{b}{-1+2i} = 2i$$

$$\frac{a(2-i)}{4+1} + \frac{b(-1-2i)}{1+4} = 2i$$

$$\frac{2a - ai - b - 2bi}{5} = 2i$$

$$= \frac{2a - b}{5} + \frac{-a - 2b}{5} = 2i$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \frac{2a - b}{5} = 0 \\ \frac{-a - 2b}{5} = 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2a - b = 0 \\ -a - 2b = 10 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 2a - b = 0 \\ -2a - 4b = 20 \end{cases} \begin{array}{l} + \\ - \end{array}$$

$$-5b = 20 \Rightarrow b = -4$$

$$\Rightarrow a = -2$$

ដូចនេះ

$$a = -2; b = -4$$

2. ក. គណនាអាំងតេក្រាលមិនកំណត់:

$$I = \int x^2 \ln x dx$$

$$\text{តាង } u = \ln x \Rightarrow du = \frac{dx}{x}$$

$$dv = x^2 dx \Rightarrow v = \frac{x^3}{3}$$

$$\text{តាមរូបមន្ត } \int u dv = uv - \int v du$$

$$\begin{aligned} \text{គេបាន } I &= \frac{x^3}{3} \ln x - \int \frac{x^3}{3x} dx \\ &= \frac{x^3}{3} \ln x - \frac{1}{3} \int x^2 dx \\ &= \frac{x^3}{3} \ln x - \frac{x^3}{9} + c \end{aligned}$$

ដូចនេះ

$$I = \frac{x^3}{3} \ln x - \frac{x^3}{9} + c$$

$$\begin{aligned}
 J &= \int \frac{\sin 2x - \cos x}{\cos x} dx \\
 &= \int \frac{2 \sin x \cos x - \cos x}{\cos x} dx \\
 &= \int (2 \sin x - 1) dx = -2 \cos x - x + c
 \end{aligned}$$

ដូចនេះ

$$J = -2 \cos x - x + c$$

ខ. កំណត់ចំនួនពិត $m; n; p$

$$\begin{aligned}
 \text{គេមាន } g(x) &= m + \frac{n}{x+1} + \frac{p}{x-3} \\
 &= \frac{m(x+1)(x-3) + n(x-3) + p(x+1)}{(x+1)(x-3)} \\
 &= \frac{m(x^2 - 2x - 3) + n(x-3) + p(x+1)}{(x^2 - 2x - 3)} \\
 &= \frac{mx^2 + (-2m + n + p)x + (-3m - 3n + p)}{(x^2 - 2x - 3)}
 \end{aligned}$$

$$\text{តើ } g(x) = \frac{x^2 + x - 6}{x^2 - 2x - 3}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} m = 1 \\ -2m + n + p = 1 \\ -3m - 3n + p = -6 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m = 1 \\ n = \frac{3}{2} \\ p = \frac{3}{2} \end{cases}$$

ដូចនេះ

$$m = 1; n = p = \frac{3}{2}$$

$$\text{គណនា } \int_0^2 g(x) dx$$

$$\begin{aligned}
&= \int_0^2 \left(1 + \frac{3}{2(x+1)} + \frac{3}{2(x-3)} \right) dx \\
&= \left(x + \frac{3}{2} \ln|x+1| + \frac{3}{2} \ln|x-3| \right) \Big|_0^2 \\
&= \left(2 + \frac{3}{2} \ln 3 \right) - \left(0 + \frac{3}{2} \ln 3 \right) \\
&= 2 + \frac{3}{2} \ln 3 - \frac{3}{2} \ln 3 = 2
\end{aligned}$$

ដូចនេះ

$$\int_0^2 g(x) dx = 2$$

3. រកប្រូបាបដែលជ្រើសរើសបានសិស្សប្រុស 2 នាក់ និងសិស្សស្រី 1 នាក់
សិស្សសរុប 12 នាក់ គេជ្រើសរើស 3 នាក់

$$\Rightarrow n(S) = C(12;3) = \frac{12!}{9!3!} = \frac{10 \times 11 \times 12}{2 \times 3}$$

$$= 10 \times 11 \times 2 = 220$$

តាង A ជាព្រឹត្តិការណ៍ជ្រើសរើសបានសិស្ស

ប្រុស 2 នាក់ និង សិស្ស ស្រី 1 នាក់

$$n(A) = C(7;2) \times C(5;1)$$

$$= \frac{7!}{5!2!} \times 5 = \frac{6 \times 7}{2} \times 5 = 105$$

$$\Rightarrow P(A) = \frac{n(A)}{n(S)} = \frac{105}{220} = \frac{21}{44} = 0,47$$

ដូចនេះ

$$P(A) = 0,47$$

4. គេឱ្យ $f(x) = 1 + 2x + 3x^2 + \dots + nx^{n-1}$

ក. កំណត់តំលៃ $a_1; a_2; a_3; \dots; a_n$

$$F(x) = a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n$$

$$\Rightarrow F'(x) = a_1 + a_2x + \dots + na_nx^{n-1}$$

ដើម្បីឱ្យ $F(x)$ ជាព្រីមីទីវនៃ $f(x)$ កាលណា

$$F'(x) = f(x)$$

$$a_1 + 2a_2x + \dots + na_nx^{n-1} = 1 + 2x + 3x^2 + \dots + nx^{n-1}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} a_1 = 1 \\ a_2 = 1 \\ a_3 = 1 \\ \dots\dots\dots \\ a_n = 1 \end{cases}$$

$$\textcircled{1} \begin{cases} x = x_0 + at \\ y = y_0 + bt \\ z = z_0 + ct \end{cases}$$

ដូចនេះ

$$a_1 = a_2 = a_3 = \dots = a_n = 1$$

ខ. បង្ហាញថា $f(x) = \frac{nx^{n+1} - (n+1)x^n + 1}{(1-x)^2}$

គេមាន:

$$\begin{aligned} &+ \begin{cases} f(x) = 1 + 2x + 3x^2 + \dots + nx^{n-1} \\ -xf(x) = -x - 2x^2 - 3x^3 - \dots - (n-1)x^{n-1} - nx^n \end{cases} \\ \hline &f(x) - xf(x) = 1 + x + x^2 + \dots + x^{n-1} - nx^n \\ &= \left(\frac{1-x^n}{1-x} \right) - nx^n \end{aligned}$$

$$= \frac{1 - x^n - nx^n(1-x)}{1-x}$$

$$= \frac{1 - (n+1)x^n + nx^{n+1}}{1-x}$$

$$= \frac{nx^{n+1} - (n+1)x^n + 1}{1-x}$$

$$f(x)(1-x) = \frac{nx^{n+1} - (n+1)x^n + 1}{1-x}$$

$$f(x) = \frac{nx^{n+1} - (n+1)x^n + 1}{(1-x)^2}$$

ដូចនេះ បង្ហាញថា

$$f(x) = \frac{nx^{n+1} - (n+1)x^n + 1}{(1-x)^2}$$

5. ក. ស្រាយបញ្ជាក់ថា (D_1) និង (D_2) អនុកូណាល់គ្នា

$$(D_1): \frac{x}{1} = \frac{y-1}{-2} = \frac{z}{3} \text{ មានវ៉ិចទ័រប្រាប់ទិស } \vec{u}(1; -2; 3)$$

$$(D_2): \begin{cases} 3x + y - 5z + 1 = 0 \\ 2x + 3y - 8z + 3 = 0 \end{cases} \parallel \times (-3)$$

$$\begin{aligned} -7x + 7z &= 0 \\ 7(-x + z) &= 0 \end{aligned}$$

$$-x + z = 0$$

$$x = z$$

យក $z = t; (t \in \mathbb{R}) \Rightarrow x = z = t$

តេបាន $3x + y - 5z + 1 = 0$

$$3t + y - 5t + 1 = 0$$

$$y - 2t + 1 = 0$$

$$y = -1 + 2t$$


$$\begin{cases} x = x_0 + at \\ y = y_0 + ct \\ z = z_0 + ct \end{cases}$$

នាំអោយបន្ទាត់ (D_2) មានវ៉ិចទ័រប្រាប់ទិស $\vec{v}(1;2;1)$

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = 1 - 2 \times 2 + 3 = 0$$

$$\Rightarrow \vec{u} \perp \vec{v}$$

តែ $\begin{cases} \vec{u} \parallel (D_1) \\ \vec{v} \parallel (D_2) \end{cases} \Rightarrow (D_1) \perp (D_2)$



ដូចនេះ បង្ហាញថា (D_1) និង (D_2) អន្តរក្នុងគ្នា ។

ខ. តើបន្ទាត់ (D_1) និង (D_2) កាត់គ្នាឬទេ?

បើ (D_1) និង (D_2) កាត់គ្នាកាលណាវាមានចំណុចប្រសព្វ

$$\begin{cases} (D_1): x = t; y = -1 + 2t; z = t \\ (D_2): x = t; y = 1 - 2t; z = 3t \end{cases}$$

ដោយបន្ទាត់ (D_1) និង (D_2) គ្មានតំលៃរបស់ t ណាមួយដែលធ្វើឱ្យ
បន្ទាត់ទាំងពីរប្រសព្វគ្នា ។

ដូចនេះ (D_1) និង (D_2) មិនកាត់គ្នាទេ ។

គ. រកចំងាយពីគល់តម្រុយ 0 ទៅប្លង់ (P)

$$\text{តាមរូបមន្ត } d(0, (P)) = \frac{|ax_0 + by_0 + cz_0 + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$$

$$\text{ដោយ } (P): 2x + 3y + z - 12 = 0$$

$$\Rightarrow a = 2; b = 3; c = 1$$

$$\text{គេបាន } d(0, (P)) = \frac{|0 + 0 + 0 - 12|}{\sqrt{2^2 + 3^2 + 1^2}} = \frac{12}{\sqrt{14}} = \frac{6\sqrt{14}}{7}$$

ដូចនេះ

$$d(0, (P)) = \frac{6\sqrt{14}}{7} \text{ (ឯកតាប្រវែង)}$$